



ساعت شروع: ۸ صبح	تعداد صفحه: ۵	رشته: ریاضی و فیزیک - علوم تجربی	سؤالات امتحان نهایی درس: شیمی ۳
مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	تاریخ امتحان: ۱۹/۳/۱۴۰۰	نام و نام خانوادگی:	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>	دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در نوبت خداداد ماه سال ۱۴۰۰	دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در نوبت خداداد ماه سال ۱۴۰۰	
نمره	سؤالات (پاسخ نامه دارد)	ردیف	


توجه: استفاده از ماشین حساب ساده (دارای چهار عمل اصلی، جذر و درصد) بلامانع است تا دو رقم اعشار دقت شود.

۱/۲۵	<p>با استفاده از واژه های درون کادر، عبارت های زیر را کامل کنید. (چند واژه اضافی است).</p> <p style="text-align: center;"><b>آب - نیتینول - آهک - فولاد - سلول سوتی - دما - کلر - سلول الکترولیتی</b></p> <p>آ) از آلیاژ ..... که به آلیاژ هوشمند معروف است امروزه در ساخت فراورده های صنعتی و پزشکی همانند قاب عینک استفاده می شود.</p> <p>ب) نوعی سلول گالوانی که شیمی دانها برای گذر از تنگنای تأمین انرژی و کاهش آلودگی محیط زیست پیشنهاد داده اند، ..... است.</p> <p>پ) قدرت پاک کنندگی صابون به عوامل گوناگونی مانند نوع پارچه، مقدار صابون، نوع ..... و ..... بستگی دارد.</p> <p>ت) برای کاهش میزان اسیدی بودن خاک به آن ..... می افزایند.</p>	۱
۲	<p>درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را تعیین کرده و در صورت نادرست بودن شکل درست آن را در پاسخ نامه بنویسید.</p> <p>آ) در شرایط یکسان رسانایی الکتریکی محلول ۰/۰ مولار هیدروفلوریک اسید (HF) کمتر از محلول ۰/۰ مولار هیدروکلریک اسید (HCl) است.</p> <p>ب) با افزایش غلظت های تعادلی مواد شرکت کننده در یک واکنش ثابت تعادل افزایش می یابد.</p> <p>پ) از جمله ویژگی های لیتیم که سبب شده از آن در ساخت باتری دگمه ای استفاده شود، کم بودن چگالی و زیاد بودن <math>E^\circ</math> آن است.</p> <p>ت) خوردگی آهن در محیط اسیدی به میزان بیشتری رخ می دهد.</p> <p>ث) با توجه به آن که میانگین آنتالپی پیوند C-C بیشتر از میانگین آنتالپی پیوند Si-Si است، پس نقطه ذوب سیلیسیم بالاتر از الماس است.</p>	۲
۱/۲۵	<p>تصاویر زیر الگوهای ساختاری صابون، اسید چرب و استر سنگین را نمایش می دهند. با توجه به آن ها به پرسش ها پاسخ دهید:</p> <p>(۱)</p> <p>(۲)</p> <p>(۳)</p> <p>آ) چربی ها مخلوطی از کدام دو ترکیب هستند؟</p> <p>ب) کدام ساختار مربوط به اسید چرب است؟</p> <p>پ) نیروی بین مولکولی غالب در ترکیب (۲) از چه نوعی است؟ چرا؟</p> <p>ت) کدام ترکیب در آب حل می شود؟</p> <p>«ادامه سوال ها در صفحه دوم»</p>	۳

ساعت شروع: ۸ صبح	تعداد صفحه: ۵	رشته: ریاضی و فیزیک – علوم تجربی	سوالات امتحان نهایی درس: شیمی ۳
مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	تاریخ امتحان: ۱۹/۳/۱۴۰۰	نام و نام خانوادگی:	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>	۱۴۰۰ سراسرکشور در نوبت خداداد ماه سال ۱۴۰۰	دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد	
نمره	سؤالات (پاسخ نامه دارد)		

ردیف	نمره	سؤالات	ردیف										
۱		<p>با توجه به شکل زیر که مقایسه رفتار نور در یک محلول و کلوئید را نشان می‌دهد به سوالات پاسخ دهید.</p>  <p>ظرف (۲)                          ظرف (۱)</p>	<p>۴ آ) کدام ظرف حاوی کلوئید است؟</p> <p>ب) علت پخش نور توسط ذرات ماده موجود در ظرف (۱) را توضیح دهید.</p> <p>پ) ماده موجود در کدام ظرف یک مخلوط همگن است؟</p> <p>ت) محتوای کدام ظرف می‌تواند زله باشد؟</p>										
۱/۲۵		<p>اگر غلظت تعادلی یون هیدرونیوم در محلول اسید HA در دمای معین برابر <math>100 \times 10^{-5}</math> مول بر لیتر و ثابت یونش این اسید برابر <math>\text{HA}(aq) \rightleftharpoons \text{H}^+(aq) + \text{A}^-(aq)</math></p>	<p>۵ آ) pH این محلول را بدست آورید.</p> <p>ب) غلظت تعادلی اسید HA را در این دما محاسبه کنید.</p>										
۱/۵		<table border="1"> <thead> <tr> <th>نیم واکنش کاهش</th> <th><math>E^\circ (\text{V})</math></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>\text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{e}^- \rightarrow \text{Ag}(\text{s})</math></td> <td>+۰/۸۰</td> </tr> <tr> <td><math>\text{Cu}^{+2}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}(\text{s})</math></td> <td>+۰/۳۴</td> </tr> <tr> <td><math>\text{Zn}^{+2}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Zn}(\text{s})</math></td> <td>-۰/۷۶</td> </tr> <tr> <td><math>\text{Mg}^{+2}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Mg}(\text{s})</math></td> <td>-۲/۳۷</td> </tr> </tbody> </table>	نیم واکنش کاهش	$E^\circ (\text{V})$	$\text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{e}^- \rightarrow \text{Ag}(\text{s})$	+۰/۸۰	$\text{Cu}^{+2}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}(\text{s})$	+۰/۳۴	$\text{Zn}^{+2}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Zn}(\text{s})$	-۰/۷۶	$\text{Mg}^{+2}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Mg}(\text{s})$	-۲/۳۷	<p>۶ با توجه به جدول زیر، به سوالات پاسخ دهید.</p> <p>آ) کدام گونه قویترین اکسید است؟</p> <p>ب) نیروی الکتروموتوری (emf) سلول گالوانی روی - مس (Zn- Cu) را محاسبه نمایید.</p> <p>پ) بدون محاسبه تعیین کنید سلول گالوانی ساخته شده از کدام دو فلز موجود در این جدول، بیشترین مقدار ولتاژ را تولید می‌کند؟ چرا؟</p>
نیم واکنش کاهش	$E^\circ (\text{V})$												
$\text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{e}^- \rightarrow \text{Ag}(\text{s})$	+۰/۸۰												
$\text{Cu}^{+2}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}(\text{s})$	+۰/۳۴												
$\text{Zn}^{+2}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Zn}(\text{s})$	-۰/۷۶												
$\text{Mg}^{+2}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Mg}(\text{s})$	-۲/۳۷												
۱/۲۵		<p>با توجه به نقشهٔ پتانسیل الکتروستاتیکی گوگرد دی اکسید (<math>\text{SO}_2</math>) به پرسش‌ها پاسخ دهید.</p> 	<p>۷ آ) این مولکول قطبی است یا ناقطبی؟ چرا؟</p> <p>ب) با بیان دلیل، اتم S را در نقشه با (+δ) یا (-δ) نشان دار کنید.</p>										
		«ادامه سوال‌ها در صفحه سوم»											

ساعت شروع: ۸ صبح	تعداد صفحه: ۵	رشته: ریاضی و فیزیک - علوم تجربی	سؤالات امتحان نهایی درس: شیمی ۳
مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	تاریخ امتحان: ۱۹/۳/۱۴۰۰	نام و نام خانوادگی:	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>	دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در نوبت خداداد ماه سال ۱۴۰۰	دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در نوبت خداداد ماه سال ۱۴۰۰	
نمره	سؤالات (پاسخ نامه دارد)		

۱/۲۵	با توجه به شکل زیر که مربوط به برقکافت سدیم کلرید مذاب است به پرسش ها پاسخ دهد.	۸												
														
	آ) نوع این سلول گالوانی است یا الکتروولیتی؟ چرا؟													
	ب) علت افزودن مقداری کلسیم کلرید به سدیم کلرید در این فرآیند چیست؟													
	پ) نیم واکنش کاتدی را بنویسید.													
۱	با توجه به ثابت یونش اسیدهای موجود در جدول زیر به پرسش ها پاسخ دهد.	۹												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>K<sub>a</sub></th> <th>فرمول شیمیایی</th> <th>نام اسید</th> <th>ردیف</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۱/۸ × ۱۰<sup>-۴</sup></td> <td>HCOOH(aq)</td> <td>فورمیک اسید</td> <td>۱</td> </tr> <tr> <td>۴/۹ × ۱۰<sup>-۱۰</sup></td> <td>HCN(aq)</td> <td>هیدروسیانیک اسید</td> <td>۲</td> </tr> </tbody> </table> <p>ب) توضیح دهید در دمای ۲۵ درجه، pH محلول یک مولار کدام اسید (HCOOH یا HCN) بیشتر است؟ (محاسبه لازم نیست).</p>	K <sub>a</sub>	فرمول شیمیایی	نام اسید	ردیف	۱/۸ × ۱۰ <sup>-۴</sup>	HCOOH(aq)	فورمیک اسید	۱	۴/۹ × ۱۰ <sup>-۱۰</sup>	HCN(aq)	هیدروسیانیک اسید	۲	آ) کدام اسید قوی تر است؟
K <sub>a</sub>	فرمول شیمیایی	نام اسید	ردیف											
۱/۸ × ۱۰ <sup>-۴</sup>	HCOOH(aq)	فورمیک اسید	۱											
۴/۹ × ۱۰ <sup>-۱۰</sup>	HCN(aq)	هیدروسیانیک اسید	۲											
۲	دلیل هر یک از عبارتهای زیر را بنویسید.	۱۰												
	آ) آلومینیوم فلزی فعال است که به سرعت در هوا اکسید شده، اما خورده نمی شود و استحکام خود را حفظ می کند.													
	ب) آنتالپی فروپاشی شبکه پتانسیم کلرید(s) KCl بیشتر از آنتالپی فروپاشی شبکه پتانسیم برمید (s) KBr است.													
	پ) برای افزایش قدرت پاک کنندگی مواد شوینده به آن ها نمک های فسفات می افزایند.													
	ت) می توان با محلول غلیظ هیدروکلریک اسید برخی لوله ها و مجاري جرم گرفته را باز کرد.													
۱/۲۵	در واکنش زیر با محاسبه تغییر عدد اکسایش، گونه اکسنده و کاهنده را تعیین کنید.	۱۱												
	$2\text{Al (s)} + 3\text{CuSO}_4\text{(aq)} \rightarrow \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3\text{(aq)} + 3\text{Cu (s)}$													
	«ادامه سوالها در صفحه چهارم»													

ساعت شروع: ۸ صبح	تعداد صفحه: ۵	رشته: ریاضی و فیزیک - علوم تجربی	سؤالات امتحان نهایی درس: شیمی ۳
مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	تاریخ امتحان: ۱۹/۳/۱۴۰۰	نام و نام خانوادگی:	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>	دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در نوبت خداداد ماه سال ۱۴۰۰		
نمره	سوالات (پاسخ نامه دارد)		

۱	<table border="1"> <thead> <tr> <th>نقطه جوش (°C)</th><th>نقطه ذوب (°C)</th><th>ماده</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-۱۹۶</td><td>-۲۰۷</td><td>N<sub>2</sub></td></tr> <tr> <td>۲۲۳۰</td><td>۱۷۱۰</td><td>SiO<sub>2</sub></td></tr> </tbody> </table>	نقطه جوش (°C)	نقطه ذوب (°C)	ماده	-۱۹۶	-۲۰۷	N <sub>2</sub>	۲۲۳۰	۱۷۱۰	SiO <sub>2</sub>	<p>با توجه به جدول زیر به پرسش ها پاسخ دهید.</p> <p>(آ) کدام ماده در گستره دمایی <u>کمتری</u> به حالت مایع است؟ چرا؟</p> <p>(ب) واژه ماده مولکولی و فرمول مولکولی را برای توصیف کدام ماده نمی توان <u>به کار برد</u>؟ چرا؟</p>	۱۲
نقطه جوش (°C)	نقطه ذوب (°C)	ماده										
-۱۹۶	-۲۰۷	N <sub>2</sub>										
۲۲۳۰	۱۷۱۰	SiO <sub>2</sub>										
۱		<p>با توجه به نمودارهای زیر به پرسش ها پاسخ دهید.</p> <p>(آ) گرماده یا گرمگیر بودن هر یک از واکنش ها را مشخص کنید.</p> <p>(ب) کدام واکنش در شرایط یکسان، سریع تر انجام می شود؟ چرا؟</p>	۱۳									
۱	<p>با توجه به شکل که در آن، واکنش تعادلی زیر در سیلندری با پیستون روان در دمای ثابت قرار دارد، به سوالات پاسخ دهید.</p> $A_2(g) + 3 B_2(g) \rightleftharpoons 2AB_3(g)$	<p>(آ) اگر در سامانه پیستون به سمت بیرون کشیده شود واکنش تعادلی در کدام جهت جابه جا می شود؟ دلیل بنویسید.</p> <p>(ب) با این تغییر شمار مولکول های AB<sub>3</sub> چه تغییری می کند؟</p>	۱۴									
۱	<p>فرمول ساختاری پلیمر سازنده بطی آب به شکل زیر است. با توجه به آن به پرسش ها پاسخ دهید.</p> $\left[ \text{O}=\text{C}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{C}=O-\text{O}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{O} \right]_n$	<p>(آ) این پلیمر از کدام دسته پلیمرهاست؟ چرا؟</p> <p>(ب) ساختار مونومرهای سازنده این پلیمر را رسم کنید.</p>	۱۵									
۱	<p>درنمودار زیر جاهای خالی (۱) تا (۴) را با نام یا فرمول ماده شیمیایی مناسب پر کنید.</p>	<p>درنمودار زیر جاهای خالی (۱) تا (۴) را با نام یا فرمول ماده شیمیایی مناسب پر کنید.</p>	۱۶									
۲۰	<p>موفق و سر بلند باشید</p>											

ساعت شروع: ۸ صبح	تعداد صفحه: ۵	رشته: ریاضی و فیزیک - علوم تجربی	سوالات امتحان نهایی درس: شیمی ۳
مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	تاریخ امتحان: ۱۹/۳/۱۳۹۹	نام و نام خانوادگی:	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>	دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در نوبت خداداد ماه سال ۱۳۹۹		
نمره	سؤالات (پاسخ نامه دارد)		

۱ H ۱/۰۰۸	۴ Be ۹/۰۱۲	۶ عدد اتمی C ۱۲/۰۱ جرم اتمی میانگین	۲ He ۴/۰۰۳
۳ Li ۶/۹۴۱	۱۲ Mg ۲۴/۳۱		۵ B ۱۰/۸۱
۱۱ Na ۲۲/۹۹			۶ C ۱۲/۰۱
۱۹ K ۳۹/۱۰	۲۰ Ca ۴۰/۰۸	۲۲ Sc ۴۴/۹۶	۷ N ۱۴/۰۱
		۲۳ Ti ۴۷/۸۷	۸ O ۱۶/۰۰
		۲۴ V ۵۰/۹۴	۹ F ۱۹/۰۰
		۲۵ Cr ۵۲/۰۰	۱۰ Ne ۲۰/۱۸
		۲۶ Mn ۵۴/۹۴	
		۲۷ Fe ۵۵/۸۵	
		۲۸ Co ۵۸/۹۳	
		۲۹ Ni ۵۸/۶۹	
		۳۰ Cu ۶۳/۵۵	
		۳۱ Zn ۶۵/۳۹	
		۳۲ Ga ۶۹/۷۲	
		۳۳ Ge ۷۲/۶۴	
		۳۴ As ۷۴/۹۲	
		۳۵ Se ۷۸/۹۶	
		۳۶ Br ۷۹/۹۰	
		۳۷ Kr ۸۳/۸۰	

راهنمای جدول تناوبی عنصرها

۶ عدد اتمی  
C  
۱۲/۰۱ جرم اتمی میانگین

مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	تعداد صفحه: ۳	رشته: ریاضی و فیزیک - علوم تجربی	راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: شیمی ۳
ساعت شروع: ۸ صبح	تاریخ امتحان: ۱۳۹۹/۳/۱۹	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	
دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۹ <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>			

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱	۱) نیتینول «۰/۲۵» ص ۸۶ ب) سلول سوختی «۰/۲۵» ص ۵۰ پ) آب «۰/۲۵»-دمای «۰/۲۵» ص ۸ ت) آهک «۰/۲۵» ص ۱۴	۱/۲۵
۲	آ) درست «۰/۲۵» ص ۱۸ ب) نادرست «۰/۲۵» - با افزایش غلظت های تعادلی مواد شرکت کننده در یک واکنش ثابت تعادل تغییر نمی کند . ب) نادرست «۰/۲۵» - از جمله ویژگی های لیتیم که سبب شده از آن در ساخت باتری دگمه ای استفاده شود، کم بودن چگالی و کم بودن $E^\circ$ آن است.«۰/۲۵» ص ۴۹ ت) درست «۰/۲۵» ص ۵۷ ث) نادرست. «۰/۲۵» - نقطه ذوب الماس بالاتر از سیلیسیم است.«۰/۲۵» ص ۷۰	۰/۲۵ ۰/۵ ۰/۵ ۰/۲۵ ۰/۵
۳	آ) ترکیب (۱) و ترکیب (۲) «۰/۲۵» ب) ترکیب (۱) «۰/۲۵» پ) واندروالسی «۰/۲۵» - زیرا بخش بزرگی ازمولکول رابخش ناقطبی (زنجیر بلند کربنی) تشکیل داده است. ت) ترکیب ۳ «۰/۲۵» ص ۵ تا ص ۶	۰/۵ ۰/۵ ۰/۲۵
۴	آ) ظرف (۱) «۰/۲۵» ب) ذرات کلوئید درشت تر از محلول هستند به همین دلیل نور را پخش می کنند . «۰/۲۵» پ) ظرف (۲) «۰/۲۵» ص ۷ ت) ظرف (۱) «۰/۲۵» ص ۷	۰/۲۵ ۰/۲۵ ۰/۵
۵	آ) ص ۲۲ تا ص ۲۴ $pH = -\log[H^+] = -\log(1 \times 10^{-3}) = ۳$ «۰/۲۵» «۰/۲۵»	۰/۵
۶	آ) «۰/۲۵» $\text{Ag}^+$ ب) انتخاب درست آند و کاتد «۰/۲۵» $emf = E_{\text{کاتد}}^\circ - E_{\text{آندر}}^\circ$ «۰/۲۵» $emf = E_{\text{Cu}}^\circ - E_{\text{Zn}}^\circ = (+۰/۳۴) - (-۰/۷۶) = +۱/۱$ «۰/۲۵» پ) سلول منیزیم - نقره «۰/۲۵» چون بیشترین اختلاف پتانسیل را دارند. «۰/۲۵» ص ۴۴ تا ص ۴۸	۰/۲۵ ۰/۷۵ ۰/۵

با سمه تعالی

مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	تعداد صفحه: ۳	رشته: ریاضی و فیزیک - علوم تجربی	راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: شیمی ۳
ساعت شروع: ۸ صبح	تاریخ امتحان: ۱۳۹۹/۳/۱۹		پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>	دانش آموزان <b>بزرگسال و داوطلبان آزاد</b> سراسرکشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۹		

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۷	آ) قطبی «۰/۲۵» - زیرا بار الکتریکی در پیرامون اتم مرکزی توزیع متقارن ندارد. «۰/۵»	۰/۷۵
	ب) در نقشه پتانسیل الکترواستاتیکی رنگ آبی تراکم کمتر بار الکتریکی را نشان می دهد «۰/۲۵» پس اتم S، با (+δ) نشان دار می شود. «۰/۲۵» ص ۷۴	۰/۵
۸	آ) الکتروولیتی «۰/۲۵» - زیرا برای انجام برقکافت نیاز به استفاده از باتری است. (یا چون این واکنش به صورت طبیعی انجام نمی شود). «۰/۲۵»	۰/۵
	ب) پایین آوردن نقطه ذوب «۰/۲۵»	۰/۲۵
	پ) کاتد (I) $\text{Na}^+(aq) + e^- \rightarrow \text{Na(I)}$ نوشتن درست نیم واکنش «۰/۲۵» تشخیص تولید سدیم در کاتد «۰/۲۵» ص ۵۵	۰/۵
۹	آ) فورمیک اسید «۰/۲۵»	۰/۲۵
	ب) هیدروسیانیک اسید «۰/۲۵» زیرا ثابت یونش آن کوچک تر است پس اسید ضعیف تری است و میزان یونش آن در آب کمتر است «۰/۲۵». از این رو غلظت یون هیدرونیوم در محلول ۱ مولار آن کمتر می باشد. «۰/۲۵» ص ۲۳	۰/۷۵
۱۰	آ) این فلز به سرعت اکسید می شود ولی با اکسید شدن و تشکیل لایه چسبنده و متراکم $\text{Al}_2\text{O}_3$ از ادامه اکسایش جلوگیری می شود به طوری که لایه های زیرین برای مدت طولانی دست نخورده باقی می ماند و استحکام خود را حفظ می کند. «۰/۵» ص ۶۱	۰/۵
	ب) زیرا شعاع یون برمید بیشتر از یون کلرید بیشتر از یون برمید است «۰/۲۵» ص ۸۰	۰/۵
	پ) زیرا این نمک ها با یون های کلسیم و منیزیم موجود در آب های سخت واکنش می دهند، «۰/۲۵» و از تشکیل رسوب و ایجاد لکه جلوگیری می کنند. «۰/۲۵» ص ۱۲	۰/۵
	ت) زیرا موادی که سبب گرفتگی این لوله ها و مجاری می شوند، خاصیت بازی دارند. «۰/۲۵» پس هیدروکلریک اسید در واکنش با این مواد فراورده های محلول در آب یا گاز تولید می کند و لوله ها و مجاری باز می شوند. «۰/۲۵» ص ۳۱	۰/۵
	«ادامه راهنمای در صفحه سوم»	

مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	تعداد صفحه: ۳	رشته: ریاضی و فیزیک - علوم تجربی	راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: شیمی ۳
ساعت شروع: ۸ صبح	تاریخ امتحان: ۱۳۹۹/۳/۱۹		پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>	دانش آموزان <b>بزرگسال و داوطلبان آزاد</b> سراسرکشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۹		

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱۱	<p><math>2Al(s) + 3CuSO_4(aq) \rightarrow Al_2(SO_4)_3(aq) + 3Cu(s)</math></p> <p>اعداد اکسایش <math>Cu</math> یا <math>Al</math> «۰/۲۵» کاهنده: «۰/۲۵» <math>Al^{2+}</math> اکسنده: «۰/۲۵» <math>Cu^{2+}</math> ص ۵۲ تا ص ۵۳</p>	۱/۲۵
۱۲	<p>(آ) «۰/۲۵» <math>N_2</math> - زیرا تفاوت نقطه ذوب و نقطه جوش آن کمتر است. «۰/۲۵» ص ۷۶</p> <p>(ب) «۰/۲۵» <math>SiO_2</math> - زیرا این ترکیب جامد کووالانسی است. «۰/۲۵» ص ۷۲</p>	۰/۵
۱۳	<p>(آ) واکنش (۱): گرماده «۰/۲۵» و واکنش (۲): گرمگیر «۰/۲۵»</p> <p>(ب) واکنش (۱) «۰/۲۵» - زیرا هر چه انرژی فعالسازی واکنش کمتر باشد سرعت واکنش بیشتر است. «۰/۲۵» ص ۹۶</p>	۰/۵
۱۴	<p>(آ) در جهت برگشت (سمت چپ) «۰/۲۵» - زیرا با افزایش حجم در دمای ثابت فشار کم می شود «۰/۲۵» پس تعادل در جهت افزایش فشار و تعداد مول های گازی بیشتر جا به جا می شود. «۰/۲۵» ص ۱۰۴ تا ص ۱۰۵</p> <p>(ب) کم می شود. «۰/۲۵» ص ۱۰۵</p>	۰/۷۵ ۰/۲۵
۱۵	<p>(آ) از دسته پلی استرها است. «۰/۲۵» زیرا واحدهای تکرار شونده آن گروه عاملی استری است. «۰/۲۵» ص ۱۱۳</p> <p>(ب)</p> <p><math>HO - CH_2 - CH_2 - OH</math></p> <p>«۰/۲۵»</p>	۰/۵ ۰/۵
۱۶	<p>(۱) اتانول «۰/۲۵» <math>C_2H_5OH</math></p> <p>(۲) اتان «۰/۲۵» <math>C_2H_6</math></p> <p>(۳) کلرواتان «۰/۲۵» <math>C_2H_5Cl</math></p> <p>(۴) پلی اتن <math>(CH_2CH_2)_n</math></p>	۱ ص ۱۱۲
	جمع نمره . خسته نباشید.	۲۰

همکار محترم ضمن عرض خدا قوت؛ لطفاً برای پاسخ‌های درست بر پایه کتاب (به جز به کاربردن تناسب در حل مسائل عددی) نموده منظور فرمایید.