

برنام خدا

101 نکته خال دار (پر تکرار)

گردش مواد

۱. بیشترین و کمترین حجم خون موجود در بطن به ترتیب در پایان S و T مشاهده می شود.
۲. بیشترین و کمترین فشار آئورت به ترتیب در پایان S و T مشاهده می شود.
۳. ماهیچه منقبض کننده قلبی از S تا T انقباض ایزومتریک (حجم ثابت) را انجام می دهد.
۴. بیشترین میزان فشار بطنی در ابتدای موج T اتفاق می افتد.
۵. دریچه های دهلیزی بطنی به سمت بطن ک دریچه های سینی به سمت دهلیز باز می شوند.
۶. در قلب صدای ممتد و مجزا قابل شنیدن است.
۷. دوره های قلبی ۰/۳۰ ۰/۴۰ در انسان در حال استراحت مشاهده می شود و نه در همه ای پستانداران.
۸. قلب در هر انقباض یک پدیده الکتریکی کلی تولید می کند نه یک موج الکتریکی.
۹. منحنی های الکتروکاردیوگرام را می توان از نقاط با حساسیت متفاوت پوست ثبت کرد.
۱۰. در یک منحنی الکتروکاردیوگرام سه موج ثبت می شود نه سه پدیده الکتریکی.
۱۱. تغییر در زمان بخش های مختلف الکتروکاردیوگرام لزوما نشانه بیماری نیست.

۱۲. در نتیجه عدم فعالیت مناسب سرخرگ های کرونر، کاهش ارتفاع موج انقباض بطنی مشاهده می شود.
۱۳. در انفارکتوس قلب به علت کمبود اکسیژن در میوکارد تولید اسیدلاکتیک افزایش می یابد و سبب افزایش درد درناحیه قفسه سینه می شود.
۱۴. بازه زمانی که خون وارد بطن ها می شود از بازه زمانی که خارج می شود بیشتر است.
۱۵. بازه زمانی که خون در دهلیز ها جمع می شود از بازه زمانی که خون در بطن جمع می شود کمتر است.
۱۶. افزایش فشار درون بطن ها بلافاصله بعد از موج R باشروع انقباض بطن ها مشاهده می شود.
۱۷. جریان خون در خلاف جهت باز شدن آنها سبب بسته شدن دریچه ها می شود.
۱۸. انقباض در هر یک از حفرات قلب باعث می شود که فشار خون در آن حفره افزایش پیدا کند.
۱۹. آغاز ضربان قلب در دوران جنینی بعد از شروع تشکیل شدن بازوها و پاها و قبل از شکل گیری آنها مشاهده می شود.
۲۰. برای تشخیص حرکات قلب در یک انسان لزوماً نباید دستگاه الکتروکاردیوگراف با سطح پوست خود فرد در تماس باشد مانند جنین در رحم مادر.
۱. دریچه های یک طرفه به سوی قلب "فقط در سیاهرگ های نواحی پایین تر از قلب" وجود دارند.

۲. مقدار زیادی از بافتی که در صلبیه چشم و پریکارد قلب (پیوندی) قرار دارد باعث جلوگیری از متورم شدن بیش از حد پاها میشود.
۳. همه جانداران (چه پرسلوی و تک سلوی... چه پروکاریوت و یوکاریوت) نیاز به تبادل مواد با محیط دارند. پس حتی باکتری ها هم نیاز به تبادل مواد با محیط دارند.
۴. همه جانوران دستگاه گردش مواد ندارند (بسیاری از آنها دارند) \Rightarrow طبق متن کتاب
۵. جریان آب درون بدن کیسه تنان بر خلاف انسان در حالت طبیعی؛ دو طرفه است. یعنی محل دفع و ورود مواد یکی است.
۶. جاندارانی مانند کیسه تنان که دستگاه گردش خون و خون ندارند؛ دستگاه گردش مواد دارند. چرا که بدن آن ها همانند تمامی جانداران نیازمند تبادل مواد با محیط است.
۷. مژک عروس دریایی؛ تنها سلول هایی که به طور مستقیم با مواد غذایی در ارتباط اند؛ سلول هایی که موجب حرکت جاندار می شوند؛ به خاطر زنش های زیاد حتماً دارای میتوکندری های فراوان هستند.
۸. سلول های دیواره رگ های پا ها و همچنین سلول های ماهیچه ای به خاطر انقباض فراوان دارای میتوکندری های گسترده و بسیار فعال هستند پس تبدیل مواد غذایی به ATP در آنها زیاد است.
۹. طبیعی است که به خاطر فعالیت زیاد ماهیچه های پاها مصرف اکسیژن آنها و همچنین تولید دی اکسید کربن آنها بسیار زیاد است.

۱۰. در لوله های شعاعی ساده ترین دستگاه گردش مواد در جانوران جهت جریان آب دوطرفه است.

۱۱. در همه جانوران تک سلولی و همچنین کم سلولی (دارای یک یا دولایه سلول) نیازی به خون نمی باشد چرا که اتصال بین سلول ها ساده و به طور مستقیم مواد و گاز ها منتقل میشوند.

۱۲. در ملخ و برگ متحرک مویرگ معنی ندارد پس در هر جایی دیدیم که نوشته شده بود مویرگ ملخ (یا هر حشره دیگری) به سرعت آن گزینه را غلط میگیریم.

۱۳. در رگ پشتی کرم خاکی جهت جریان خون از عقب به جلو و در رگ شکمی کرم خاکی جهت جریان خون از جلو به عقب است.

۱۴. این که خونی که از قلب کرم خاکی و ماهی عبور میکند تیره است به این معنا نیست که خود قلب کرم خاکی و ماهی با خون تیره تغذیه میشود. سلول های قلب کرم خاکی و ماهی همانند سایر سلول های بدن با خون روشن تغذیه میشوند. منظور از عبور خون تیره از قلب کرم خاکی و ماهی؛ عبور خون تیره از دریچه های قلب کرم خاکی و ماهی است.

۱۵. قلب خرچنگ دراز که نوعی سخت پوست است و گردش خون باز دارد دارای چهار دریچه است.

۱۶. هرگاه در سوالی ذکر شده بود که مواد غذایی به طور مستقیم بین خون و سلول های بدن مبادله میشوند منظور سوال این است که جاندار مورد سوال دارای گردش خون باز است یعنی جز یکی از دسته های عنکبوتیان، سخت پوستان یا حشرات است.

۱۷. تنها دسته ای از مهره داران که گردش خون بسته "ساده" دارند ماهی ها هستند.

۱۸. به سمت سر و دم ماهی خون روشن پمپاژ میشود و خون تمامی رگ های شکمی ماهی تیره است.

۱۹. در ماهی همانند انسان خون عبوری از دستگاه گردش خون بلافاصله به دستگاه تنفس میرود و در آنجا غنی از اکسیژن می شود.

۲۰. خون سرخرگ شکمی ماهی همانند خون سرخرگ ششی انسان تیره است یعنی دارای مقادیر بالای دی اکسید کربن است؛ که از اینجا میفهمیم هر هر سرخرگی لزوماً خون روشن ندارد.

۱_ دقت کنید که بر اساس شکل کتاب درسی ص ۹۲، هسته‌ی سلول‌های تارکشنه در حاشیه سلول بوده و حجم کمی دارد.

۲_ در مسیر پروتوبلاستی تنها اسمز و اختلاف فشار آب در سلول‌های مجاور تاثیر گذار است.

۳_ در مسیر غیر پروتوبلاستی علاوه بر اسمز (در حین جذب آب توسط تارکشنه) نیروی هم‌چسبی بین مولکول‌های آب نیز تاثیر گذار است.

۴_ در شکل ۲۵_۶ در صفحه‌ی ۹۳ دقت کنید پلاسمودسماتا جمع پلاسمودسم میباشد ب معنای چندین مجموعه از پلاسمودسم‌ها.

۵_ توجه داشته باشید که در هر انتقال فعال قطعاً ATP مصرف نمیشود... در فصل هشت سال پیش دانشگاهی مثال نقض آن را خواهید خواند ☺

جمله‌ی درست‌تر این است که در هر انتقال فعال قطعاً انرژی زیستی مصرف میشود.

۶_ طبق متن کتاب آب از راه پوستک از گیاه خارج میشود در حالی که پوستک عامل عدم خروج آب از گیاه است[☺]..

منظور، شکاف های موجود در پوستک میباشد.

۷_ صعود شیره ای خام در در مسیر پروتوبلاستی همزمان با تاثیر مکش تعرقی و فشار ریشه ای انجام میگردد.

۸_ عدسک ها حاصل تاثیر کامبیوم چوب پنبه ساز بر روپوست گیاه میباشند.

۹_ دقت کنید که میانبرگ اسفنجی در همه ای گیاهان وجود دارد اما... پارانشیم های نرده ای خیر! این موضوع در شکل صفحه ای ۱۸۸ کتاب درسی سال چهارم مشهود است[☺].

۱۰_ در شکل ۲۷_۶: دو دسته آوند در میان پارانشیم اسفنجی میبینید:

دسته ای آوندی بالا آوند چوبی و دسته ای آوندی پایین آوندهای آبکشی میباشند

۱۱_ تعریق تنها از طریق یک نوع روزنه انجام میگردد اما توجه شود که تعرق از طریق چند نوع روزنه انجام میشود.

۱۲_ توجه شود که دو نوع سلول هستند که دیواری سلولی نابرابر دارند:

سلول های کلانشیمی با نابرابری نامشخص

و سلول های نگهبان روزنه با نابرابری مشخص

۱۳_ دقت کنید این که بگوییم تعداد سلول های روزنه های هوایی دوتاست اشتباه است زیرا همه ای روزنه های هوایی سلول نگهبان روزنه ندارند! همچون عدسک ها[☺]

۱۴_ نکته‌ی خفن^۷... : با کاهش فشار آماسی سلول‌های احاطه کننده‌ی سلول‌های نگهبان روزنه، نیروی کشش_ هم چسبی گیاه افزایش میابد.

۱۵_ دقت شود ک گیاهان تیره گل ناز با توجه به فصل ۸ سال چهارم جزو گیاهان CAM هستند ینی در شب روزنه هارا باز و اسید کراسولاسه میسازند و در روز برای حفظ آب روزنه هارا میبنند.

۱۶_ توجه کنید ک علاوه بر روزنه‌های زنده‌ی هوایی ، عدسک‌ها نیز حاصل فاصله گرفتن چند سلول از یکدیگر هستند.

۱۷_ به شکل ۲۸_۶ دقت کنید:

روزنه‌ها‌ی پایین برگ‌ها به صورت حفره در می‌آیند تا از تبخیر بیش از حد آب جلو گیری شود.

۱۸_ در هنگام بسته شدن روزنه طول سلول‌های نگهبان کاهش میابد اما بدليل وجود نوار‌های سلولزی شعاعی اطراف سلول، قطر سلول تغییر چندانی نمیکند.

۱۹_ در پریسیکل، از شش دیواره‌ی هر سلول، چهار دیواره با نوار کاسپاری پوشیده شده است.

۲۰_ در اثر هیپرتیروئیدیسم و پر کاری قشر فوق کلیه افزایش ارتفاع QRS مشاهده می‌شود.

۱. کاهش اکسیژن رسانی به بافت‌ها سبب تولید اریتروپویتن و در نتیجه افزایش تولید گلبول‌های قرمز و پلی سیتمی میشود.

۲. در طی انعقاد خون پلاکت دو ماده تولید میکند: ترومبوپلاستین و ماده ای که سبب چسبندگی سایر پلاکتها میشود.

۳. پروترومبین و فیبرینوژن در پلاسما محلول اند اما ترومبین و فیبیرین نامحلول اند.

"رگ"های لنفی برخلاف "گره"های لنفی در سراسر بدن وجود دارند.

۴. ماکروفازها به طور "مستقیم" باعث از بین رفتن میکروب های "لنف" و به طور "غیر مستقیم" باعث از بین رفتن میکروبهای "خون" میشوند.

۵. به دلیل وجود دریچه در رگهای لنفی عبور مواد یک طرفه است و درنهایت به سیاه رگ میریزند.

۶. پلاکت غیر فعال، پروترومبین، فیبرینوژن، کلسیم و ویتامین α همواره در خون وجود دارند

۷. پلاکت فعال، ترومبین، فیبیپلاستی و ترومبوپلاستین در طی انعقاد خون ایجاد میشوند.

۸. کاهش کلسیم میتواند در روند تبدیل پروترومبین به ترومبین (انعقاد خون) اختلال ایجاد کند. عواملی که سبب کاهش کلسیم میشوند: کاهش ویتامین D در بدن - پرکاری تیروئیدو در نتیجه افزایش ترشح کلسی تونین - کم کاری پاراتیروئید که سبب کاهش هورمون پاراتورمون، فعال نشدن ویتامین D، کاهش جذب Ca از روده، کاهش بازجذب Ca از ادرار میشود.

۹. تعداد پلاکتها از گلبول های سفید بیشتر و از گلبول های قرمز کمتر است.

۱۰. اکثر افراد Rh مثبت هستند.

۱۱. فاکتور انعقادی شماره ۷۸۳ که عدم وجود آن سبب ناتوانی در انعقاد خون و ایجاد بیماری هموفیلی است و به دلیل نقص ژنی ساخته نمیشود) فعال کننده ترومبوپلاستین است.

۱۲. گلبول های قرمز در همه جانوران فاقد هسته نیستند.

۱۳. خون Rh منفی در حالت عادی فاقد پادتن ضدRh است و تزریق خون Rh مثبت به آن سبب تولید پادتن ضد Rh در خون فرد Rh منفی میشود و تکرار این تزریق میتواند واکنش شدیدی در بدن میزبان ایجاد کند.

۱۴. در بارداری دوم به بعد اگر مادر Rh منفی و جنین Rh مثبت باشد، آنتی ژن Rh از خون جنین به خون مادر وارد شده، پادتن ضد Rh در بدن مادر به وجود آمده از جفت عبور کرده و باعث آگلوتینه شدن خون جنین میشود.

۱۰. پلاسمای فرد سالم فاقد کدام است؟

*اریتروپویتین *پروتروپویتین

*گاماگلوبین *هموگلوبین

۱۶. ائوزینوفیل ها در آلرژی (نوعی اختلال دستگاه "ایمنی") زیاد میشوند.

۱۷. امکان حضور هموگلوبین در گره های لنفی وجود دارد > در دوران جنینی ☺

۱۸. بازوфیل ها همانند ماستوسیت ها هیستامین ترشح میکنند اما بازوفیل ها در خون و ماستوسیت ها در بافت اند.

۱۹. ائوزینوفیل ها موادی تولید میکنند که برای انگل ها کشنده است.

۲۰. مونوسیت ها حرکات آمیبی دارند.

- ۱_ هر جانور دارای قلب دو حفره ای آبشش دارد.
- ۲_ قلب دوزیستان سه حفره ای است که معنی آن است که خون تیره و روشن در قلب مخلوط میشود.
- ۳_ ساده ترین گردش مواد مربوط به اسفنج ها، خزه گیان و تک سلولی هاست.
- ۴_ ساده ترین دستگاه گردش مواد مربوط ب کیسه تنان است.
- ۵_ دقت کنید که قلب کرم خاکی نیز میباشد خون روشن وارد شود تا سلول های خود قلب تغذیه گردند.
- ۶_ در حفرات قلب خرچنگ برخلاف ماهی خون روشن جریان دارد.
- ۷_ اگر جانور دارای خط جانبی، قادر به جفت کمان آبششی باشد ممکن است قادر به غضروفی نیز باشد.
- ۸_ دریچه های منافذ قلبی در ملخ در هنگام دیاستول همانند دریچه های قلبی در انسان در هنگام سیستول دهلیز ها باز است.
- ۹_ دقت کنید بر اساس متن کتاب درسی، بی مهرگان نیز رگ بسته دارند و تنها انتهای بعضی از رگ ها باز است.
- ۱۰_ با توجه به شکل ۳_۶ علاوه بر دریچه های قلب ملخ، خون از طریق حفره ای انتهایی در مجاورت مخرج نیز به قلب باز میگردد.
- ۱۱_ بر اساس آزمون های قلم چی بی مهرگان مویرگ ندارند اما بر اساس متن کتاب درسی بی مهرگان شبکه مویرگی ((کامل)) ندارند.