

## هرمون های گیاهی (تنظیم کننده های رشد)

هرمون های گیاهی (تنظیم کننده های رشد)		
محرك های رشد	اکسین ها	سیتوکینین ها
بازدارنده های رشد	جیبرلین ها	آبسیزیک اسید
افزایش رشد طولی یاخته - تحریک ریشه زایی و تکثیر رویشی گیاهان با استفاده از قلمه - تشکیل میوه های بدون دانه و درشت کردن میوه - تولید سومومی برای از بین بردن بعضی دو لپه ای ها - چیرگی راسی		
معروف به هرمون های جوانی - تحریک تقسیم یاخته ای و به تأخیر انداختن پیری - افشاشه (اسپری) شدن بر روی برگ و گل - در کشت بافت، سبب ایجاد ساقه از یاخته های تمایز نیافته می شوند		
افزایش طول ساقه با تحریک رشد طولی و تقسیم یاخته - رشد میوه - رویش دانه - تولید میوه های بدون دانه و درشت کردن میوه		
عامل بسته شدن روزنه ها و در نتیجه حفظ آب گیاه و همچنین مانع از رویش دانه و رشد جوانه ها در شرایط نامساعد است - به طور کلی رشد گیاهان را در پاسخ به شرایط نامساعد، کاهش می دهد		
از میوه های رسیده و بافت های آسیب دیده گیاه و سوختن سوخت های فسیلی، اتیلن تولید می شود - رسیدن میوه های نارس - ریزش برگ و ریزش میوه - توقف رشد جوانه های جانی	اتیلن (گازی شکل)	


\* عامل نارنجی که مخلوطی از اکسین ها بود، سبب تخریب بعضی گیاهان دو لپه ای می شد  
این ماده در انسان سبب سرطان و تولد نوزادان با نقص های مادرزادی می شد.

**دقچ کنید** اکسین در ساقه صرف سبب افزایش رشد طولی یاخته می شود نه تکثیر آن ها !  
(ما) از آنچه ای که ریشه زایی را نیز تحریک می کند، می تواند در تقسیم یاخته ای در ریشه  
نیز موثر باشد

**چیرگی راسی** : به اثر بازدارنده گیاه راسی بر رشد جوانه های جانی، چیرگی راسی  
می گویند . با قطع جوانه راسی ، مقدار سیتوکینین در جوانه های جانی افزایش و مقدار  
اکسین آن ها کاهش می یابد در نتیجه جوانه های جانی رشد می کنند .  
اگر بعد از قطع جوانه راسی ، در محل برش ، اکسین قرار دهیم؛ جوانه های جانی رشد  
نمی کنند در نتیجه می فهمیم اکسین از جوانه راسی به جوانه های جانی می رود و مانع از  
رشد آنها می شود . اکسین جوانه راسی، تولید اتیلن در جوانه های جانی را تحریک می کند  
و در نتیجه با افزایش اتیلن در جوانه های جانی، رشد آنها متوقف می شود .

- \* خم شدن گیاهان به سمت نور پدیده ای رایج در طبیعت است
- \* داروین و پسرش از آزمایش بر روی چمن که از گندمیان است، دریافتند دانه رُست در صورتی به سمت نور یک جانبه نوری که از یک طرف به گیاه می تابد) خم می شود که نوک آن در برابر نور باشد .

\* محققان دیگر (نه داروین!) متوجه شدند که عامل خم شدن دانه رُست به سمت نور، ماده ای است که در نوک گیاه وجود دارد



- \* نور باعث تجمع اکسین در سمت سایه می شود (تجمع را با تولید اشتباه تکثیرید ! در همان محل ساقه تولید می شود اما نور باعث چاپه چایی آن به سمت سایه می شود) در اثر تجمع اکسین در سمت سایه، یاخته های این قسمت رشد طولی کرده (با تقسیم اشتباه تکثیرید !) و ابعاد این یاخته ها از یاخته های سمت نور بیشتر می شود . در نتیجه گیاه به سمت نور خم می شود

**نکته:** اکسین در هر طرف تجمع یابد ، گیاه به سمت مخالف آن خم می شود

- \* رشد جهت دار اندام های گیاه در پاسخ به نور یک جانبه را نورگرایی نامیدند . کلمه اکسین به معنای رشد کردن است .
- انواعی از ترکیبات مشابه اکسین در گیاهان متفاوت ساخته می شوند که اثرات مشابه دارند؛ این گروه از ترکیبات، اکسین ها نامیده شدند .

**دقچ کنید** اکسین نام یک ترکیب خاص است و اکسین ها، خود اکسین و ترکیبات مشابه آن را شامل می شود

- \* تنظیم کننده های رشد یا هرمون های گیاهی، ترکیباتی هستند که رشد و فعالیت گیاهان را کنترل می کنند
- محرك های رشد :** در فرایند های رشد مانند تحریک تقسیم یاخته، رشد طولی یاخته ها، ایجاد و حفظ اندام ها نقش دارند .
- گرچه این تنظیم کننده ها را به عنوان محرك رشد می شناسیم؛ اما بر اساس مقدار و محل اثر ممکن است نقش باز دارندگی نیز داشته باشند

**باز دارنده های رشد :** در فرایند های متفاوتی مانند مقاومت گیاه در شرایط سخت، رسیدگی میوه ها، ریزش برگ و میوه نقش دارند

مثال	تقسیم بندی گیاهان گل دار (بر اساس نیاز به نور برای گل دهی)	
گیاه دادوودی	در روز های کوتاه پاییز گل می دهد . به شب طولانی نیاز دارد	روز کوتاه
شبدر	در تابستان گل می دهد . به شب کوتاه نیاز دارد	روز بلند
گوجه فرنگی	شامل بعضی گیاهان است که وابسته به طول شب و روز نیستند	بی تفاوت

**نکته فعالیت:** شکستن شب های طولانی با جرقه نوری (مثل چراغ قوه)، سبب گل دهی گیاهان روز بلند، و همچنین عدم گل دهی گیاهان روز کوتاه می شود

\* گیاهان هر دمایی را نمی توانند تحمل کنند . سرمای شدید می تواند مانع از رویش دانه ها و جوانه ها شود . بعضی گیاهان علاوه بر نیاز های نوری ، برای گل دادن نیاز به گذراندن یک دوره سرما نیز دارند . مثلا برای **نوعی گیاه** گندم مشاهده شده است که اگر بذر آن را مرطوب کنیم و در سرما قرار دهیم ، دوره رویشی آن کوتاه می شود و زودتر گل می دهد (دقت کنید که زودتر گل می دهد : نه اینکه سرما برای گل دهی آن الزامی باشد !)

\* ساقه در خلاف جهت گرانش و ریشه درجهت گرانش زمین رشد می کند (البته دقت کنید این موضوع در مواردی مثل زمین ساقه که افقی رشد می کند ، صادق نیست) رشد جهت دار اندام های گیاه نسبت به گرانش زمین ، زمین گرایی نامیده می شود

\* ساقه درخت مو در تماس با درختی دیگر و یا پایه ، به دور آن می پیچد . پیچش به علت تفاوت رشد ساقه در بخش قرار گرفته روی تکیه گاه و سمت مقابل آن ایجاد می شود؛ به طوری که رشد یاخته ها در محل تماس کاهش می یابد

**نکته:** پیچش به علت تفاوت در رشد یاخته ها است؛ نه تفاوت در تکثیر آن ها

**توضیح و یادآوری:** اگر رشد چاند دار رو در نظر پنگیریم دونوع رشد داریم : افتریش عین قابل پارگشتن ابعاد یاخته ها ۲ تقصیم و تکثیر یاخته ها (اما در مورد رشد یاخته ها، فقط پندرگ شدن مود یاخته رو پاید در نظر پنگیریم

**نکته مهم:** توجه کنید خود اکسینی که از جوانه راسی به جوانه جانبی می آید ، مستقیماً مانع رشد آن ها می شود . اما تولید اتیلن در جوانه های جانبی ، بر اثر اکسین موجود در جوانه راسی است ! نه اکسینی که به جوانه های جانبی آمده !

**نکته:** اکسین ، محرك رشد در راس گیاهان و بازدارنده رشد در جوانه های جانبی است

**نکته فعالیت:** در فن کشت بافت ، هم برای ایجاد ساقه و هم برای ایجاد ریشه ، سیتوکینین و اکسین هردو لازم هستند اما با نسبت ها و غلظت های متفاوت

**نکته:** نقش آبسیزیک اسید و اکسین ها در رشد جوانه های جانبی ، مشابه و در جوانه راسی مخالف یکدیگر است

**نکته:** می توان گفت اتیلن سبب تشکیل رنگ دیسه در میوه گوجه فرنگی می شود

**نکته:** سیتوکینین ها ، جیبرلین ها و اکسین ها برخلاف اتیلن و آبسیزیک اسید ، هر کدام گروهی از ترکیب ها هستند؛ نه یک ترکیب !

**نکته:** توجه کنید که آبسیزیک اسید فقط می تواند سبب بسته شدن روزنه ها شود و در باز شدن آن ها نقشی ندارد ! (کنکور ۹۵)

\* دانشمندان ژاپنی با استخراج و شناسایی ترکیبات به دست آمده از **قارچ جیبرلا** ، جیبرلین ها را شناسایی و معرفی کردند

\* آلدگی دانه رست های برنج به قارچ جیبرلا ، سبب رشد سریع و خم شدن و روی زمین افتادن این گیاهان می شود؛ در نتیجه محصول برنج کاهش می یابد

\* رویان **غلات** در هنگام رویش دانه ، مقدار فراوانی جیبرلین می سازند (دانه ای که هنوز رویش را شروع نکرده و په اصطلاح حفته است، جیبرلین ندارد !). این هورمون بر خارجی ترین لایه آندوسپرم (لایه گلوتن دار) اثر می گذارد و سبب تولید و رهاشدن آنزیم های گوارشی در دانه می شود . این آنزیم ها **دیواره یاخته ها** (پرای تجزیه دیواره چه آنزیم هایی لازم پود ؟ پس پاید پروتئاز و ائواعی از کربوهیدرات در دانه **تولید شود**) و **ذخایر آندوسپرم** را تجزیه می کنند . نشاسته یکی از این ذخایر است که بر اثر آنزیم آمیلاز تجزیه می شود

**دقت کنید** جیبرلین را رویان ، و آنزیم های گوارشی را لایه گلوتن دار می سازد

\* درختان با کاهش سرما گل می دهند (البته دقتش کنید که فقط همان دانگان **توان** یعنی **تولید** گل دارند ! و درختان مثل پارگانگان ، گل **تولید نمی کنند**). گلبرگ های بعضی گیاهان در شب بسته می شوند

\* بعضی گیاهان در فصلی خاص و بعضی در همه فصل ها گل می دهند . گیاه هنگامی گل می دهد که سرلاحد رویشی که در جوانه قرار دارد ، به سرلاحد گل یا زایشی تبدیل شود. این تبدیل به شرایط محیطی مانند **دما** و **طول روز و شب** وابسته است

**۷ محافظت توسط جانوران :** مورچه ها به جانوران کوچک (حشره، پستاندار کوچک و گیاهان دارزی) که قصد خوردن برگ های درخت آکاسیا را دارند، حمله می کنند  
**\* گرده افشاری درخت آکاسیا** به وسیله زنبور هاست . وقتی گل های آکاسیا باز می شوند ، نوعی ترکیب شیمیایی تولید و منتشر می کنند که با فراری دادن مورچه ها مانع از حمله آن ها به زنبورهای گرده افشار می شود  
**\* بعضی گیاهان** در برابر حمله گیاه خواران ، مواد فراری تولید و در هوا پخش می کنند که سبب جلب جانوران دیگر می شود. یک نمونه از این فرایند در شکل زیر قابل مشاهده است :



**دقّت کنید** ترکیبات فراری را که از یاخته های آسیب دیده ی گیاه تثبیط کو ترشح می شود ، پا نیکوتین و آکالولوئید ها (اشتباه نگیرید !)

**دقّت کنید** زنبور مادر ، نوزاد کرمی شکل را نمی کشد ! بلکه این نوزاد کرمی شکل ، در اثر تقدیمه نوزادان زنبور می میرد

با تشکر فراوان از دکتر نوید درویش پور بابت همکاری در انجام این پروژه

Navid's Channel: @zistDVPP

\* ضربه زدن به برگ (نه گل !) گیاه حساس ، باعث بسته شدن برگ های آن می شود (یادآوری : گلبرگ بعضی گیاهان در شب بسته می شود)

\* در برگ گیاه گوشت خوار ، کرک ها نقشی معادل گیرنده ی حسی جانوران دارند و با راه اندازی پیام هایی سبب به دام انداختن حشره توسط برگ می شوند . در تعدادی از گیاهان ، برگ ها کرک هایی دارند که حشره های کوچک نمی توانند روی این برگ های کرک دار به راحتی حرکت کنند (استفاده از کرک به منظور دفاع : نه شکار !)

\* زنگ گندم و سیاهک گندم ، قارچ هایی هستند که سبب تخریب محصولات کشاورزی می شوند

\* **عوامل دفاعی گیاهان :**

۱ پوستک تا حدودی مانع از ورود عوامل بیماری زا می شود

۲ دیواره یاخته ای نیز محکم است و عبور از آن کار دشواری است همچنین در دیواره ممکن است لیگنین یا سیلیس وجود داشته باشد که سبب سخت تر شدن آن می شوند

۳ بافت چوب پنبه نیز در اندام های مسن گیاهان ، علاوه بر حفظ آب ، مانعی در برابر عوامل آسیب رسان است

۴ کرک و خار نیز در دفاع از گیاهان نقش دارند

۵ بعضی گیاهان در پاسخ به زخم ، ترکیباتی ترشح می کنند که در محافظت از آنها نقش دارند . گاه حجم این ترکیبات آن قدر زیاد است که حشره در آن به دام می افتد . با سخت شدن این ترکیبات ، سنگواره هایی ایجاد می شود که حشره در آن حفظ شده است (دقّت کنید در سنگواره ایجاد شده ، گیاه ترکیبات را به منظور محافظت از زخم ها ترشح کرده است نه برای به دام انداختن حشرهای !)

۶ **دفاع شیمیایی :**

- تعدادی از گونه های گیاهی ترکیبات سیانید دار تولید می کنند که پس از تجزیه این ترکیبات و تولید سیانید ، سبب اختلال در تنفس یاخته ای شده و مرگ یا بیماری گیاه خواران را به دنبال دارد .

- آلkalوئیدها در دور کردن گیاه خواران نقش دارند . نیکوتین که از آلkalوئیدهاست ، چنین نقشی در گیاه تثبیط دارد

\* گیاهان سازوکار های متفاوتی برای جلوگیری از اثر این مواد بر فرایندهای یاخته ای خود دارند . یکی از این سازوکارها ، تولید موادی است که به خودی خود سمی نیستند اما پس از تجزیه توسط گیاه خوار ، سمی می شوند . مثل ترکیبات سیانید دار

۷ **مرگ یاخته ای :** ورود ویروس در گیاه فرایندهایی را به راه می اندازد که نتیجه آن ، مرگ یاخته های آلوده و قطع ارتباط آن ها با بافت های سالم است . در مرگ یاخته ای ، یاخته به وسیله آنزیم های خود گوارش می شود . (سالیسیلیک اسید که از تنظیم کننده های رشد گیاهان است ، در مرگ یاخته ای نقش دارد)