


فصل ۱



فعالیت ۱

یاخته های عصبی حسی ، طول بیشتری دارند ، آسه های میلین دار به جسم یاخته ای متصل اند
یاخته های حرکتی ، طول بیشتری دارند ، آسه میلین دار و دارینه بدون میلین به جسم یاخته ای متصل
اند ،
یاخته های عصبی رابط ، کوتاه تر هستند ، آسه و دارینه بدون میلین دارند.

فعالیت ۲


در گروه خود درباره پرسش های زیر گفت و گو و تیجه را به کلاس گزارش کنید.

۱- کارپ سدیم-پتاسیم-کاتال های نشتی را با هم مقایسه کنید.

۲- چرا در حالت آرامش ، بارمثبت درون یاخته های عصبی از بیرون آنها کمتر است ؟

- ۱- پمپ سدیم - پتاسیم با مصرف ATP ، سه یون سدیم را از سلول خارج و دو یون پتاسیم را به آن وارد می کند . یون های پتاسیم ، بدون مصرف ATP و به علت شبی غلظت از راه کانال های نشتی سلول خارج می شوند و یون های سدیم با همین روش به سلول وارد می شوند.
- ۲- چون در حالت آرامش ، یون های پتاسیم از راه کانال های نشتی سلول خارج می شوند و نفوذ پذیری غشاء به این یون ها زیاد است .

فعالیت ۳



با توجه به شکل ۷ در مرحله الف ، کانال های دریچه دار بسته می شوند و چون کانال های نشتی و پمپ سدیم - پتاسیم در حال فعالیت اند ، پتانسیل غشاء -70 میلی ولت است . در حالت ب ، کانال های دریچه دار سدیمی باز و یون های سدیم وارد می شوند و پتانسیل غشاء مثبت تر می شود . در حالت پ ، کانال های دریچه دار پتاسیمی باز و پتانسیل غشاء دوباره منفی می شود و در حالت هر دو کانال دریچه دار ، بسته و پتانسیل آرامش برقرار می شود . در این حالت پمپ سدیم - پتاسیم شبی غلظت یون های سدیم و پتاسیم را برقرار می کند .

فعالیت ۴

پژوهشگران براین پاورتن که در گره های رانبه ، تعداد زیادی کانال دریچه دار وجود دارد ، ولی در فاصله بین گره ها ، این کانال ها وجود ندارند . این موضوع با هدایت چهشی چه ارتباطی دارد ؟

وجود این کانال ها موجب حرکت یون ها (ورود و خروج آن ها) فقط در این گره ها می شود . در نتیجه پتانسیل عمل در این گره ها ایجاد و جریان عصبی سریع تر منتقل می شود .

فعالیت ۵

با استفاده از آنچه آموختید در گروه خود درباره پرسش های زیر گفت و گو و پاسخ را به کلاس گزارش کنید .

۱- هنگام ورزش چگونه تعادل خود را حفظ می کنید ؟

۲- هنگام راه رفتن با چشم اندازی ، چه تغییری در راه رفتن ایجاد می شود ؟ علت تغییر را توضیح دهید .

۳- چگونه ممکن است با وجود سلامت کامل چشم ها ، فرد قادر به دیدن نباشد ؟

- ۱- هنگام ورزش اندام هایی مانند چشم ، گوش ، پوست ، بیام هایی برای مراکز عصبی به ویژه مخچه ارسال می کنند . مخچه با بررسی این اطلاعات پیام حرکتی را برای ماهیچه ها می فرستد تا با افقاض آن ها ، تعادل بدن در هر حالتی حفظ شود .
- ۲- چون چشم ها بسته اند ، اطلاعاتی از آن ها به مراکز عصبی مثل مخچه ارسال نمی شود در نتیجه فرد نمی تواند به طور طبیعی راه برود .
- ۳- آسیب دیدن بخش هایی از مغز و راه های عصبی که به بینایی مربوط اند موجب می شود با وجود سلامت چشم فرد قادر به دیدن نباشد .

فعالیت ۶

درباره درستی یا نادرستی عبارت های زیر اطلاعاتی را جمع آوری کرده و به کلاس ارائه کنید .

● استفاده از قلیان به اندازه سیگار خطرناک نیست .

● فرد با یک بار مصرف ماده انتی اید آور ، معتاد نمی شود .

● مصرف تیاکو با سرطان دهان ، حنجره و شش ارتباط مستقیم دارد .

● مصرف مواد انتی اید آوری که از گیاهان به دست می آیند ، خطر چندانی ندارد .

فقط جمله سوم درست و بقیه نادرست است


مواد و وسائل لازم: موز سالم گوسفند (یا گوساله)، وسائل تشريح، دستکش

با کمک معلم مغز را برای تشريح آماده کنید.

۱- بررسی بخش های خارجی مغز

(الف) مشاهده سطح پشتی: مغز را ماند شکل در ظرف تشريح قرار دهید روی مغز بقایای پرده منتهی وجود دارد آنها را جدا کنید تا شیارهای مغز پهتر دیده شوند کدام بخش های مغز را با مشاهده سطح پشتی آن می توانید ببینید؟


(ب) مشاهده سطح شکمی مغز: مغز را برگردانید با قیمانده منظر را به آرامی جدا کنید و بخش های مغز را در این سطح مشاهده کنید.



(۲- مشاهده بخش های درونی مغز: مغز را طوری در ظرف تشريح قرار دهید که سطح پشتی آن را ببینید. با انگشتان شسته، به آرامی دونیمکره را از محل شیارین آنها از یکدیگر فاصله دهید و بقایای پرده های منتهی را زین دونیمکره خارج کنید تا نوار سفید رنگ رابط پینه ای را ببینید.

در حالی که نیمکره های مخ از هم فاصله دارند، با نوک چاقوی جراحی، در جلوی رابط پینه ای، برش کم عمقی ایجاد کنید و به آرامی فاصله نیمکره ها را بیشتر کنید تا در این موضع رابط پینه ای مشاهده کنید. دو طرف این رابط ها، فضای بطن های

(۳- مغز داخل آنها، اجسام مخلوط قرار دارند. شبکه های مویرگی که مابع مغزی - نخاعی را ترشیح می کنند نیز درون این بطن ها دیده می شوند)



در مرحله بعد به کمک چاقوی جراحی در رابط سه گوش، برش طولی ایجاد کنید تا در زیر آن، تالاموس ها را ببینید. دو تالاموس پاییک را بخط به هم متصل آند و با کمترین فشار از هم جدا می شوند.

در عقب تالاموس ها، بطن سوم و در لبه پایین این بطن، ابی فیز را ببینید. در عقب ابی فیز برجستگی های چهارگانه قرار دارند.

در مرحله بعد کرمینه مخدج را در امتداد شیارین دونیمکره برش دهید تا درخت زندگی و بطن چهارم مغز را ببینید.


توجه: مطالب زیر خط دار، نکات مهم متن هستند که می توانند در امتحانات و پرسش ها استفاده شوند.

فعالیت ۸

با استفاده از شکل ۲۰ به این پرسش‌ها پاسخ دهید:

۱- پس از احساس درد، چه رویدادهایی رخ می‌دهد تا فرد دست خود را عقب بکشد؟

۲- در مسیر عقب کشیدن دست، کدام سیناپس‌ها تحریک کننده و کدام مهارکننده‌اند؟




۱- نورون حسی پیام گیرنده حسی را به نخاع می‌برد و نورون‌های رابط ۱ و ۲ این پیام را دریافت می‌کنند. نورون‌های رابط با نورون‌های حرکتی سیناپس دارند که یکی از این نورون‌های رابط به ماهیچه دو سر مرتبط است یا سیناپس دارد و ماهیچه دو سر را منقبض می‌کند و نورون رابط دیگر با ماهیچه سه سر مرتبط است و ماهیچه سه سر را به استراحت وادار می‌کند و در نتیجه دست عقب کشیده می‌شود.

۲- سیناپس نورون حسی به نورون رابط ۱ و ۲ تحریکی، سیناپس نورون رابط ۱ به نورون تحریک کننده ماهیچه دو سر تحریکی و سیناپس نورون رابط ۲ به ماهیچه سه سر بازدارنده است.

فعالیت ۹

از بخش‌های تشکیل دهنده دستگاه عصبی، یک نقشه مفهومی تهیه کنید



فصل ۲

فعالیت ۲

با استفاده از شکل ۶، تغییرات چشم هنگام تطابق برای دیدن جسم دور و تزدیک را مقایسه کنید.

۱- گیرنده‌های شیمیایی: گیرنده‌های چشایی، گیرنده‌های میزان اکسیژن آئورت، گیرنده‌های بویایی بینی

۲- گیرنده‌های دمایی: گیرنده‌های دما

۳- گیرنده‌های نوری: گیرنده‌های شبکیه چشم

۴- گیرنده‌های مکانیکی: گیرنده‌های فشار پوست، گیرنده‌های فشار خون در دیواره رگ‌ها

فعالیت ۱

گیرنده‌های زیر را در پنج گروه گیرنده که با آنها آشنا شدید، طبقه‌بندی کنید.

گیرنده‌های چشایی روزی زبان، گیرنده‌های میزان اکسیژن در آئورت، گیرنده‌های شبکیه چشم، گیرنده‌گرما،

گیرنده‌های فشار پوست، گیرنده‌های بویایی بینی، گیرنده‌های فشار خون در دیواره رگ‌ها

برای دیدن اجسام نزدیک: عدسی ضخیم می شود چون تارهای آویزی اطراف آن شل شده اند و علت آن هم انقباض ماهیچه های مژگانی است اما برای دیدن اجسام دور: عدسی باریک تر می شود چون تارهای آویزی آن را از اطراف می کشند و علت آن هم استراحت یا انبساط ماهیچه های مژگانی است.

فعالیت ۳

- با استفاده از شکل ۷ بگویید نزدیکی بینی و دوربینی با استفاده از کدام عدسی اصلاح می شوند؟
- در برخی افراد، علت نزدیکی بینی و دوربینی، تغییر همگرایی عدسی چشم است. با استفاده از آنچه آموختید، بگویید تغییر همگرایی عدسی در چشم، چگونه موجب نزدیکی بینی و دوربینی می شود؟

با توجه به شکل ۷ عدسی و اگر نزدیکی بینی و عدسی هم گرا دوربینی را اصلاح می کند. همگرا بودن بیش از حد عدسی، موجب نزدیکی بینی و کم بودن تحدب آن به دوربینی منجر می شود



Shall 3 - کره چشم پوش خورده

می توانید سه لایه چشم و بخش های تشکیل دهنده آنها و نقطه کور را بینید. لایه شبکیه بسیار نازک است، دقت کنید هنگام کار جمع نشود به طرز قرار گرفتن عدسی توجه کنید. در کنار عدسی، جسم مژگانی، و تارهای آویزی که عدسی را احاطه کرده اند، دیده می شوند. عدسی را به آرامی خارج کنید. مانع زلایه و زجاجیه ژله ای را مشاهده کنید. در این حالت، زلایه به طور کامل شفاف نیست؛ زیرا مقداری از دانه های سیاه ملانین از بخش های دیگر چشم در آن رها شده اند.

جسم مژگانی به شکل حلقه ای دور محل استقرار عدسی قرار دارد. درون این حلقة، عنیبه قرار دارد که نازک تر و شامل ماهیچه های صاف حقوقی (اتنگ کننده مردمک) و شعاعی (گشادکننده مردمک) است. سوراخ وسط عنیبه همان مردمک است. جسم مژگانی و عنیبه به آسانی جدا می شوند و قرنیه شفاف و برآمده دیده می شود.

پس از انجام تشریح و با استفاده از مشاهده های خود، به این پرسش ها پاسخ دهید.

(الف) ویژگی های هریک از سه لایه چشم و بخش های تشکیل دهنده آنها ایجاد کنید.

(ب) زجاجیه و زلایه را با یکدیگر مقایسه کنید.

از فعالیت خود گزارش تهیه کنید و به معلم ارائه دهید.

Shall 4 - بخش های درونی چشم

تشریح چشم

فعالیت ۴

مواد و وسایل لازم: چشم سالم گاو به همراه ماهیچه های آن، وسایل تشریح، دستکش برای هر گروه.



برای آماده کردن چشم از دیر خود راهنمایی بخواهید

۱- بررسی ویژگی های ظاهری چشم: برای تشخیص بالا و پایین چشم، فاصله عصب بینایی تا قرنیه را در نظر بگیرید. سطحی از کره چشم که در آن فاصله عصب تا روی قرنیه بیشتر است، سطح بالایی چشم و سطح دیگر، سطح پایینی آن است (شکل ۱). برای تشخیص چپ یا راست بودن چشم، آن را طوری در دست بگیرید که سطح بالایی آن رو به بالا باشد. قرنیه به شکل تخم مرغ دیده می شود و بخش پهنه تران په سمت بینایی و بخش باریک تر آن به سمت گوش قرار دارد (شکل ۲)، راه دیگر، بررسی عصب بینایی است، این عصب پس از خروج از چشم به سمت مخالف، خم می شود.

در ادامه، بافت های چربی بین ماهیچه ها و کره چشم را جدا و ماهیچه های آن را مشاهده کنید. برای مشاهده دقیق ماهیچه ها از مولاز چشم استفاده کنید.

۲- تشریح: ماهیچه ها را با قیچی از کره چشم جدا کنید. چشم را روی ظرف تشریح قرار دهید و با چاقوی جراحی، صلبیه را در فاصله یک سانتی متری از قرنیه سوراخ کنید و با قیچی دورتا دور قرنیه را در این فاصله برش دهید. دقت کنید قیچی را خیلی درون کره چشم فرو نپرید تا زجاجیه آسیب نمیند (شکل ۳). پس از برش

نام لایه و توصیف آن	موقعیت	ادامه لایه در جلوی چشم می شود:	نقش اصلی
صلببیه سفید و محکم(بافت پیوندی)	خارجی ترین لایه کره چشم	قرنیه شفاف	نقش محافظتی
مشیمیه با مویرگ ها و رنگدانه فراوان	لایه میانی کره چشم	جسم مژگانی و عنبیه رنگی	نقش تأمین مواد غذایی و اکسیژن
شبکیه با یاخته های عصبی و گیرنده نور	داخلی ترین لایه کره چشم	-	تبديل تصویر به پیام عصبی

ب) زلاییه مایع است و حجم کمی دارد اما زجاجیه ژله ای است و با حجم بیشتر . زلاییه در فضای کوچکی، جلوی مردمک و عدسی قرار دارد اما زجاجیه در فضای بزرگتری پشت مردمک و عدسی است . زلاییه اکسیژن و مواد غذایی لازم را برای عدسی و قرنیه شفاف و بدون رگ تأمین می کند اما زجاجیه برای حفظ حالت کروی کره چشم است.(می توانید این مطالب را در جدول با هم کنید. ملاک مقایسه هم جنس ، مقدار ، محل یا موقعیت، نقش یا وظیفه است)

فعالیت ۵

- بین بخش پیرونی و میانی گوش کدام ساختار قرار دارد؟
 - استخوان های کوچک در کدام بخش گوش قرار دارند؟
 - حلقه گوش در کدام بخش آن قرار دارد؟

پرده صماخ گوش میانی گوش درونی •

فعاليت

درباره نقش حفاظتی موها و مواد ترشحی در مجرای شنبایی گوش اطلاعات جمع‌آوری و به کالاس

لرانه گند


جزم یا موم گوش مخلوطی از چربی ها و موم هاست که مجرای گوش را نرم می کند. اسیدی بودن موم گوش از رشد میکروب ها در مجرای شنوایی پیشگیری می کند. موهای درون گوش و موم گوش از ورود گرد و غبار، حشرات و دیگر جانوران ریز یه درون مجرای گوش جلوگیری می کنند.

فَعَالْتُ

دیاره شغا، شتمان، سنج، و بنام، سنج، گزارش، تهیه و به کلاس اراده کند.

این گزارش ها باید شاما، محدوده فعالیت این متخصصان و میزان تحصیلات لازم باشد و در به این شغا، ها باشد.

فَعَالْت



لوب های (پیازهای) پیچیده، ماهی، نسبت به کل مغز چانور از لوب های پیچیده، انسان پیچیده تر است.

اين مطلب چه واقعيتی را درباره حس یوپای ماهی نشان مي دهد؟

۲- ساختار و عملکرد چشم مرکب و چشم انسان را مقایسه کنید.

۳- خط جانبی در ماهی‌ها پا کدام ساختارها در انسان مشابه دارد؟

۱- حس بویایی ماهی قویتر از حس بویایی انسان است

۲- در چشم حشرات، واحدهای بینایی و عدسی های متعدد وجود دارد و حاصل عملکرد چشم ، یک تصویر موزائیکی است اما در چشم انسان یک عدسی وجود دارد و تصویر یک یارجه است.

۳- گبندنهای تعادلی، محادیه، نسیم دا به

فصل ۳

فعالیت ۱

سال گذشته با ساختار بافت پیوندی و اجزای آن آشنا شدیم. الف) با توجه به اطلاعات قبلی هر بافت پیوندی از چه بخش‌هایی تشکیل شده است؟ ب) عاده زمینه‌ای استخوان توسط چه بخشی ساخته می‌شود؟

الف) سلول‌ها، رشته‌ها و ماده زمینه‌ای ب) بخش سلولی

فعالیت ۲

به طور کلی تراکم توده استخوانی در زنان و مردان با هم مقاومت دارد. جدول زیر تراکم استخوانی زنان و مردان را در سنین مختلف نشان می‌دهد.

میانگین تراکم استخوان		
مرد	زن	سن
۰/۹۷۹	۰/۸۹۵	۲۰
۰/۹۳۶	۰/۸۸۶	۳۰
۰/۸۹۴	۰/۸۵۰	۴۰
۰/۸۵۱	۰/۷۹۷	۵۰
۰/۸۰۹	۰/۷۳۳	۶۰
۰/۷۶۶	۰/۶۶۷	۷۰
۰/۷۲۴	۰/۶۰۷	۸۰

۱- منحنی تغییر تراکم توده استخوانی را در دو جنس رسم کنید.

۲- در کدام جنس تراکم استخوان بالاتر است؟

۳- بین سنین ۲۰ تا ۵۰ سالگی شدت تغییرات تراکم استخوان در مردان بیشتر است یا زنان؟

۱- رسم نمودار ۲- مردان ۳- زنان

فعالیت ۳

با استفاده از مولاژ‌های موجود و نمونه‌های آماده میکروسکوپی آزمایشگاه مدرسه، انواع استخوان و بافت‌های استخوانی را مشاهده و با هم مقایسه کنید.

فعالیت ۴

الف) به نظر شما چه مقاومت‌هایی بین دوندگان دوی صدعتر و ماراتن از نظر تعداد و درصد تارهای ماهیچه‌ای تند و کند وجود دارد؟

ب) کدام گروه هنگام فعالیت ورزشی حرقه‌ای خود به اکسیژن نیاز بیشتری دارد؟

پ) مقدار میوگلوبین ماهیچه‌های مؤثر در ورزش حرقه‌ای این ورزشکاران چه مقاومتی دارد؟

الف) در دوندگان دو صد متر، درصد تارهای ماهیچه‌ای تند بیشتر و در دوندگان ماراتن (استقامتی) کند بیشتر است. ب) دوندگان ماراتن ج) در دوندگان ماراتن مقدار میوگلوبین ماهیچه‌ها بیشتر است

فعالیت ۵

با استفاده از منابع علمی تحقیق کنید هر یک از انواع اسکلت درونی یا بیرونی چه مزایا و محدودیت‌هایی دارد. نتایج تحقیق خود را به صورت گزارش در کلاس ارائه کنید.

بر اساس منابع، پاسخ‌ها می‌تواند متفاوت باشد. به طور کلی اسکلت بیرونی نقش حفاظتی بیشتری دارد ولی این نوع اسکلت با افزایش اندازه جانور، حجم و وزن بیشتری پیدا می‌کند که باعث سنگین شدن جاندار می‌شود. این مسئله موجب محدودیت در افزایش اندازه جانور می‌شود.

فعالیت ۱

استفاده از نمک ید دار می تواند ید مورد نیاز بدن را تأمین کند. تحقیق کنید که نمک های ید دار در چه شرایطی خواص خود را حفظ می کنند و چه غذاهایی مانع جذب ید می شوند؟

استفاده از نمک ید دار می تواند ید مورد نیاز بدن را تأمین کند. تحقیق کنید که نمک های ید دار در چه شرایطی خواص خود را حفظ می کنند و چه غذاهایی مانع جذب ید می شوند؟ شرایط حفظ نمک ید دار: باید دور از نور، هوا و رطوبت نگاه داشته شود. بسته بندی اولیه نمک ید دار باید دارای چنین شرایطی باشد. جنس ظرف نگهداری نمک باید پلاستیک، چوبی، سفالی یا شیشه های تبره باشد نه فلزی. زمان اضافه کردن آن به غذا باید در انتهای زمان پخت باشد تا حداکثر مدار ید در آن حفظ شود. نمک ید دار نباید بیش از یک سال نگهداری شود چون بخشی از ید آن از بین می رود غذاهایی که مانع جذب ید می شوند: خانواده کلم، ذرت، سویا از مهمترین این مواد هستند.

فعالیت ۲

تحقیق کنید که برای پیشگیری از دیابت نوع II چه باید کرد؟

مهمنترین کارهایی که برای پیشگیری از دیابت نوع ۲ باید انجام داد عبارت است از: ۱- برخورداری از رژیم غذایی متوازن ۲- جلوگیری از افزایش وزن و تجمع بافت چربی ۳- ورزش ۴- اندازه گیری قند خون همچنین به روز نگه داشتن دانش فردی درباره بیماری و دانستن توصیه های به روز پیشگیری از آن برای جلوگیری از بیماری ضروری است

فصل ۵**فعالیت ۱**

تحقیق کنید که:

الف) چری سطح پوست چه فواید دیگری دارد؟

ب) جوش های پوستی و شوره سر چه ارتباطی با چری پوست دارد؟

(الف) فواید دیگر چربی سطح پوست: مانع از دست رفتن آب از یاخته های بدن می شود. مانع از دست رفتن آب از یاخته های بدن می شود. ورود بیش از حد آب به یاخته های بدن می شود و خشکی سطح پوست را برطرف می کند.

(ب) جوش پوستی: گاهی منافذ غددی که ماده چرب ترشح می کنند مسدود می شوند. به این ترتیب ماده چرب در آن ها تجمع می یابد. باکتری هایی که این محیط را بآب آن ها مناسب است در این غده ها رشد می کنند و در نتیجه تجمع ماده چرب و فعالیت باکتری ها نقطه متورمی بصورت جوش پوستی ایجاد می شود.

شوره سر: یاخته های پوست سر نیز هم چون پوست سایر نقاط بدن در حال ریزش اند. این ریزش با سرعت مشخصی رخ می دهد اما ممکن است گاهی سرعت آن چنان زیاد شود که یاخته های مرده به هم بچسبند و به صورت پوسته های سفیدی یا شوره سر آشکار شوند.

فعالیت ۲


مخاط مژگدار دستگاه تنفس چگونه مانع نفوذ میکروب ها می شود؟

چه عواملی به این بخش آسیب می زند؟

۱- ترشحات مخاط حاوی ماده ای چسبناک است که میکروب ها را به دام می اندازد و از نفوذ آن ها به قسمت های درونی تر جلوگیری می کند ۲- ترشحات مخاط دارای مواد ضد میکروبی است ۳- حرکت مژک ها مخاط و میکروب های به دام افتاده در آن را به سوی حلق می رانند. در آن جا به خارج بدن هدایت شده و یا با ورود به معده توسط اسید معده نابود می شوند. عواملی که به این بخش آسیب می زند شامل: دود سیگار و قلیان و آلانینه های هوا

فعالیت ۳

در شکل زیر، انواع گویچه های سفید نشان داده شده است (مقیاس گویچه ها نسبت به هم رعایت نشده است). با توجه به آنچه که در سال قبل خوانده اید:



(الف) نام هر یک را بیان کنید.

(ب) میان یاخته در کدام گویچه ها دانه دار و در کدام بدون دانه است؟

(ج) دانه ها از چه چیزی ساخته شده اند؟

الف) از راست به چپ: اتوژینوفیل ، لنفوسیت ، بازو فیل ، منوسیت ، نوتروفیل ب) دانه دار : اتوژینوفیل ، بازو فیل ؛ نوتروفیل بدون دانه : لنفوسیت و منوسیت ج) ریز کیسه های حاوی مولکولی دفاعی بهتر است دانش آموزان از یاخته هایی که می بینند شکل رسم کنند.

فعالیت ۴

یک گسترش آماده خون را با میکروسکوپ مشاهده و انواع گویچه های سفید را در آن مشاهده کنید.

فعالیت ۵

الف) علت قرمزی، تورم و گرم شدگی موضع التهاب را چگونه توضیح می دهد؟

ب) خروج خوناب پیشتر در محل التهاب از رگ چه اهمیتی دارد؟

در رابطه با چرک و مواد موجود در آن تحقیق کنید

الف) قرمزی و گرم شدگی : جربان بیشتر خون تورم : خروج خوناب

ب) پروتئین های موجود در خوناب (پادتن ها و پروتئین های مکمل) به مقدار بیشتری در محل آسیب حضور پیدا می کنند.

در رابطه با چرک و مواد موجود در آن : چرک مایعی است که در محل التهاب و در عفونت های باکتریایی و قارچی پدید می آید و شامل گویچه های سفید مرده ، میکروب های مرده و بقاوی یاخته ای است.

فعالیت ۶

الف) تعب چگونه بر فعالیت میکروبها اثر می گذارد؟

ب) چراته های شدید خطرناک اند؟

الف) افزایش دما مانع کار آنزیم های میکروب ها می شود

ب) چون ممکن است آنزیم های خود بدن (از جمله آنزیم های تنفسی) هم نتوانند به درستی کار کنند و در کار یاخته ها اختلال ایجاد شده ، مرگ رخ دهد .

سیالیت غشاء تحت تأثیر قرار می گیرد (بیشتر می شود) و غشاء نفوذ پذیری بیشتری پیدا می کند.

فعالیت ۷

آنفلوانزای پرنده کان را ویروسی پدید می آورد که می تواند سایر گوته ها، از جمله انسان را آنژ الوده کند. این

ویروس به شش ها حمله می کند و سبب می شود دستگاه اینمی بیش از حد معمول فعالیت کند. بدین ترتیب،

به تولید انبوه و بیش از اندازه لنفوسیت های T می انجامد.

الف) علت مرگ بر اثر آلوودگی با این ویروس را چگونه توجیه می کنید؟

ب) چه راهی را برای کنترل این بیماری در جمیعت ها پیشنهاد می کنید؟

الف) افزایش غیر طبیعی یاخته های T (به علت تولید بیش از حد آن ها) باعث نابودی سلول های خودی و در نتیجه مرگ می شود.

ب) ممانعت از انتشار بیماری از فرد آلوده به فرد سالم با رعایت بهداشت فردی و عمومی ، افزایش آگاهی جامعه و اطلاع رسانی .

فعالیت ۸

علت شدید تر بودن پاسخ ایمنی در برخورد دوم نسبت به برخورد اول چیست؟

وجود یاخته های خاطره باعث می شود در مدت زمان کوتاه تری تعداد بیشتری لنفوسیت ایجاد شود

که به افزایش پاسخ ایمنی می انجامد.

فعالیت ۹

الف) کودکان ایرانی چه واکسن هایی را دریافت می کنند؟ در چه زمانی؟

ب) چرا بعضی از واکسن ها را باید تکرار کرد؟

الف) پاسخ در جدول مقابل:

برنامه ایمن سازی کودکان	
نوع واکسن	سن
ب.ثز - فلح اطفال + هابیت ب **	بدو تولد
سه گانه - فلح اطفال - هابیت ب **	۲ ماهگی
سه گانه - فلح اطفال	۴ ماهگی
سه گانه - فلح اطفال هابیت ب	۶ ماهگی
MMR	۱۲ ماهگی
MMR - سه گانه - فلح اطفال	۱۸ ماهگی
سه گانه - فلح اطفال	۴-۶ سالگی

سه گانه (تلات) دیفتری، کزان، سیاه سرفه
MMR سرخک، سرخچه، اوریون

فعالیت ۱

در دنیای جانداران یاخته‌های چند هسته‌ای به روش‌های مختلفی ایجاد می‌شوند. در سال گذشته با بعضی از این یاخته‌ها آشنا شدیم. آیا می‌توانید بعضی از آنها را نام ببرید؟ در مورد نحوه تشکیل این نوع از یاخته‌ها تحقیق کنید و نتیجه آن را به کلاس ارائه دهید.

(الف) یاخته ماهیچه مخطط که از به هم پیوستن چند سلول در دوران جنینی ایجاد می‌شود. بعضی از یاخته‌های چند هسته‌ای نیز از تقسیم هسته، بدون تقسیم سیتوپلاسم حاصل می‌شوند مانند بعضی قارچ‌ها و آغازیان

فعالیت ۲

با توجه به آنچه درباره چربه یاخته‌ای فراگرفته‌اید تصاویر میکروسکوپی زیرا بر اساس مراحل آن، با شماره‌گذاری صرتیب کنید.

**فعالیت ۳**

با استفاده از منابع علمی بررسی کنید که کدام نوع از سرطان‌ها در کشور ما شیوع بیشتری دارند. چرا بعضی از نوع سرطان در بخش‌های خاصی از کشور ما شایع‌ترند؟ **به عهده دانش آموز**

به دلایلی مانند: ۱- سبک زندگی ناسالم از نظر تغذیه (استفاده زیاد از غذاهای کبابی، دودی و سرخ کردنی یا چایی داغ) از نظر کم تحرکی منجر به شیوع چاقی ، ۲- منطقه جغرافیایی زندگی (مناطق با هوای آلوده یا آفتات سوختگی بیشتر) ، ۳- مناطق دارای بیشترین معتمدان به مواد مخدر (سیگار ، قلیان ، و ... تا تریاک و حشیش و ... مواد مخدر صنعتی) که دسته اول بیشتر دچار سرطان می‌روند و دسته دوم و سوم بیشتر به سرطان ریه و پوست دچار می‌شوند

فعالیت ۴

با استفاده از خمیر بازی (چند رنگ) و بارعايت موارد پهداشتی، مراحل تقسیم رشتمان را طراحی کنید
برای این کار، عدد فامتن‌های یاخته فرضی را ۴ یا ۵ در نظر بگیرید. هر مجموعه فامتن‌ها را یک رنگ انتخاب کنید و با توجه به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

(الف) در متافاز فامتن‌های همتا نسبت به هم چگونه روی رشته‌های دوک قرار می‌گیرند؟
(ب) با توجه به عدد فامتن‌های انتخابی، تعداد فامتن‌ها و فامینک‌ها را قبل و بعد از رشتمان تعیین کنید.

(الف) بصورت جداگانه و مستقل (ب) تعداد فامتن‌ها قبل از رشتمان و بعد از رشتمان با هم برابرند ولی تعداد فامینک‌ها قبل از رشتمان، دو برابر تعداد آن‌ها بعد از رشتمان است. (به مثال زیر توجه کنید)



نکته مهم: یاخته الف و یاخته ب به هم شباهت دارند چون هر دو ۴ فام تن دارند! اما تفاوت آن‌ها در این است که یاخته الف ۴ فام تن دو فامینکی دارد ولی یاخته ب، ۴ فام تن تک فامینکی دارد. اگر این تصویری از یک یاخته باشد در دو مرحله از زندگی اش است. شکل الف آغاز تقسیم رشتمان و شکل ب در انتهای تقسیم رشتمانش است.(چرا این تقسیم، کاستمان نیست؟)

فعالیت ۵

۱- تقسیم کاستمان ۱ از نظر نحوه آرایش فامتن‌ها و جدا شدن آنها تفاوت اساسی با تقسیم رشتمان دارد.
آیا می‌توانید با توجه به شکل‌های رشتمان و کاستمان، این تفاوت‌ها را بیان کنید؟

۲- تقسیم کاستمان ۲ را با تقسیم رشتمان مقایسه کنید. چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی بین این دو فرایند وجود دارد؟

۱- فام تن‌های همتا در کاستمان ۱ در کنار هم، تشکیل تتراد(چارتایه) می‌دهند ولی در رشتمان چنین نیست و همتاها از هم جدا هستند . (در مرحله پروفاز)


فام تن‌های همتا در کاستمان ۱ (به شکل تتراد)، روی یک رشته دوک قرار می‌گیرند ولی در رشتمان (مستقل از هم) روی رشته‌های جداگانه دوک قرار می‌گیرند (در مرحله متافاز)

در آنفاز ۱ کاستمان ، فام تن‌های همتای دو فامینکی از هم جدا می‌شوند و توسط رشته‌های دوک به سمت دو قطب یاخته حرکت می‌کنند اما در رشتمان فامینک‌ها از هم جدا می‌شوند و توسط رشته‌های دوک به دو سمت مخالف (دو قطب) کشیده می‌شوند


در آنافاز ۱ کاستمان ، عدد فام تنی نصف می شود ولی در رشتمان عدد فام تنی ثابت می ماند.

۲- این دو فرآیند از نظر نحوه آرایش کوموزوم ها در مراحل مختلف مشابه اند ولی عدد فام تنی باخته های کاستمان ۲ نصف تعداد فام تن های باخته های مادری قبل از کاستمان است .

نکته : تصاویر زیر "دو مرحله از زندگی یک یاخته دیپلولئید" ، با عدد فام تنی $n = 6$ ، است. در کدام تصویر زیر، یاخته در حال تقسیم رشتمان و کدام کاستمان است؟ سپس تعیین کنید هر یک در کدام مرحله از تقسیم هستند؟



الف



ب

تصویر الف و ب هر دو از نظر آرایش فام تنی(روی خط استوای یاخته اند)

شبیه هم هستند و هر دو در مرحله متافاز ند. اما کدام تقسیم رشتمان است و

کدام کاستمان؟ چون تعداد فام تن ها و موقعیت آن ها شبیه اند ظاهرا

تشخیص آن مشکل است. به شکل فام تن ها دقیق کنید.

-فام تن های شکل الف هیچکدام شبیه هم نیست یعنی از نظر ساختار ظاهری ، با هم فرق دارند (چون فام تن های همتا حضور ندارند) و یاخته یک مجموعه فام تنی دارد یا یاخته n فام تنی یا هاپلولئید است . وقتی در یک مرحله از زندگی یاخته دیپلولئید این یاخته را با عدد فام تنی هاپلولئید دیدید حتماً یاخته دیپلولئید در حال تقسیم کاستمان است (حال سوال اینست که کاستمان ۱ است یا ۲؟ قبل از نگاه کردن به جواب خودتان کمی فکر کنید) .

نماد عدد فام تنی یاخته الف را این طور نشان می دهنده : $n = 6$

-اما فام تن های (شکل ب) دو تا دو تا به هم شبیه هستند(چون فام تن های همتا حضور دارند) و یاخته ، دو مجموعه فام تنی دارد یا $2n$ فام تنی یا دیپلولئید است. نماد عدد فام تنی یاخته ب را این طور نشان می دهنده : $n = 6$

پس یاخته وقتی که یک مجموعه ای یا n فام تنی(یا هاپلولئید) است در حال تقسیم کاستمان است و یاخته وقتی که دو مجموعه فام تنی دارد $2n$ فام تنی(یا دیپلولئید) و در حال تقسیم رشتمان است . قبل از آرایش فام تن ها در خط میانی یا خط استوای یاخته معلوم است که هر دو یاخته در مرحله متافاز اند اما وقتی معلوم شد که یاخته در حال تقسیم کاستمان است این سوال پیش می آید که کاستمان ۱ یا ۲ و چرا...

یاخته (الف) در کدام مرحله متافاز کاستمان است؟ متافاز کاستمان ۱ یا متافاز کاستمان ۲؟ در پروفاز ۱ ، متافاز ۱ ، ساختار تتراد داشتیم و حتی در آنافاز ۱ ، فام تن های همتای تترادی روی یک رشته دوک داشتند از هم دور می شدند. اینجا اثری از تتراد نیست پس کاستمان ۱ نیست و کاستمان ۲ می شود که خیلی هم شبیه متافاز رشتمان است (در این مثال حتی آرایش فام تن ها روی دوک ها و تعداد فام تن ها شبیه بودند که گول زننده است!). تنها فرقش با رشتمان همین هاپلولئید یا n کروموزمی بودن یا یک مجموعه فام تنی داشتن در حالت الف است .

تمرین : شکل های زیر یاخته هایی در حال تقسیم اند با دلیل مشخص کنید :

					نوع تقسیم
					مرحله تقسیم
					نماد عدد فام تنی
					نوع تقسیم یاخته ای چیست : (یعنی رشتمان است یا کاستمان؟)

عدد فام تنی یاخته ها چیست؟ (یعنی تعداد فام تن ها) و نماد عدد فام تنی را با $(\dots = n)$ مشخص می کنید (با توجه به شکل، جای نقطه گین، عدد می گذارید)

یاخته ها در کدام مرحله از تقسیم رشتمان اند (پروفاز، متافاز، آنافاز یا تلوفاز؟ کدام؟ با دلیل)

یاخته ها در کدام مرحله از تقسیم کاستمنان اند (پروفاز-۱ یا ۲، متافاز-۱ یا ۲، آنافاز-۱ یا ۲، تلوفاز-۱ یا ۲؟ کدام؟ با دلیل)

فعالیت ۶

با استفاده از خمیر بازی و بارعایت موادر پهداشتی، طرح ساده‌ای از مراحل تقسیم میوز را بسازید. برای این کار، عدد کروموزومی یاخته فرضی را، ۴۶ یا ۸۰ در نظر بگیرید. بهتر است که هر مجموعه از کروموزومها با یک رنگ انتخاب شوند.

بر عهده دانش آموز

فعالیت ۷

با استفاده از منابع علمی، با انواع دیگری از بیماری‌های ناشی از باهم‌ماندن کروموزوم‌ها آشنا شوید و گزارش این بررسی را در کلاس ارائه کنید.


فعالیت ۸

منحنی زیر، رابطه بین سن مادر در هنگام بارداری و احتمال به دنیا آمدن فرزند مبتلا به نشانگان داون را نشان می‌دهد.

الف) منحنی را تفسیر کنید.

ب) احتمال به دنیا آمدن فرزند مبتلا به بیماری در یک مادر ۵۰ ساله چقدر است؟

پ) احتمال به دنیا آمدن فرزند مبتلا به بیماری داون در یک مادر ۴۵ ساله چند برابر مادر ۳۵ ساله است؟



الف) وقتی مادران در سن بالا باردار می شوند ، احتمال این که فرزندشان داون باشد بیشتر است . این افزایش احتمال در سنین بالای ۴۰ سال بیشتر خواهد بود ب) حدود ۱۰ برابر (اگر درصد متولدها مبتلا به داون در مادران ۳۵ ساله را حدوداً ۰,۳ درصد در نظر بگیریم)


فعالیت ۱

- با توجه به شکل ۲ در مورد پرسش های زیر با هم گفت و گو کنید.
- (الف) به چه دلیل ابتدا تقسیم رشتمن و سپس کاستمن رخ می دهد؟
- (ب) در انسان زام یاخته اولیه، ثانویه و زام یاختک از لحاظ فامتی با هم چه تفاوت هایی دارند؟
- (پ) زام یاختک و زامه با هم چه تفاوت ها و شباهت هایی دارند؟

الف) هدف از رشتمن افزایش تعداد یاخته ها در لایه زاینده است. با توجه به این که یاخته های این لایه مرتباً به زامه تبدیل می شوند برای پابرجا ماندن و حفظ لایه زاینده، ابتدا یاخته ها با رشتمن زیاد می شوند و سپس در تعدادی از آن ها کاستمن رخ می دهد.

ب) زام یاخته اولیه: از نظر عدد فام تنی (تعداد فام تن ها)، یاخته دیپلوبیود یا ۲۰ فام تنی (۴۶ کروموزم در انسان) است و تعداد فام تن های آن با زامه زا برابر است چون از تقسیم رشتمن زامه زا ایجاد شده است و از نظر شکل، فام تن هایش به شکل تترادی (۲۳ تتراد) دیده می شوند.
زام یاخته ثانویه: از نظر عدد فام تنی، هاپلوبیود یا ۱۰ فام تنی (۲۳ فام تن در انسان) است و تعداد فام تن های آن نصف زام یاخته اولیه و زامه زا است چون از تقسیم کاستمن ۱ در زام یاخته ها ایجاد شده اند و از نظر شکل، فام تن های این یاخته به شکل دو فامینکی (۲۳ فام تن دو فامینکی) هستند.

زام یاختک: از نظر عدد فام تنی یاخته هاپلوبیود یا ۵ فام تنی (۳۲ فام تن در انسان) و تعداد فام تن های آن مثل زام یاخته ثانویه است چون از تقسیم کاستمن ۲ در زام یاخته ثانویه ایجاد شده اند و از نظر شکل، فام تن های یاخته به شکل تک فامینکی (۲۳ فام تن تک فامینکی) هستند.



پ) زام یاختک و زامه هر دو از نظر فام تنی مثل هم اند یعنی یاخته هایی هاپلوبیودی (۵ فام تنی) با فام تن های تک فامینکی (۲۳ فام تن تک فامینکی) هستند(شباهت)

یاخته های زام یاختک: درون دیواره لوله زامه ساز و بصورت متصل به هم و تمایز نیافته (یاخته به حالت گردتر با هسته درشت و سیتوپلاسم زیادتر و تقریباً بدون تاژک) وجود دارند اما

یاخته های زامه : در وسط لوله زامه ساز بصورت مجزاً از هم و تمایز یافته (یاخته به حالت کشیده با هسته فشرده و سیتوپلاسم ناچیز و تاژک دار) دیده می شوند

فعالیت ۲

با توجه به ترکیبات مالیع منی وجود تعداد زیادی اسپرم در آن، برای جلوگیری از بعضی از بیماری ها مثل عفونت، یا التهاب پروستات چه نکات پهداشتی را باید رعایت کرد؟ در این رابطه اطلاعاتی را جمع آوری و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید. به عهده دانش آموز

رعایت پهداشت فردی در همه موقع مانند حمام کردن و تعویض به موقع لباس های زیر، جلوگیری از چاقی

فعالیت ۳

شروع یائسگی همراه با علائمی است. در مورد علائم این دوره و روش های کاهش بروز این علائم، تحقیق کرده و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید.

مرحله اول یا پیش یائسگی علائمی مانند گرفتگی، تعریق شبانه و خشکی واژن ایجاد می شود که از یک سال تا ده سال قبل از یائسگی اتفاق می افتد (بطور متوسط ۴ سال) که در مراحل بعدی یائسگی این علائم خفیف تر می شود.

در مرحله دوم یا مرحله یائسگی، پریود یا قاعده ای قطع می شود که اگر به مدت ۱۲ ماه قطع شود یائسگی قطعی است (برداشتن تخدمان ها باعث یائسگی ناگهانی می شود).

برای جلوگیری از گرفتگی باید از موارد محرک (مثل غذاهای تند) پرهیز کنند، از وسایل خنک کننده و لباس های خنک استفاده شود. هنگام گرفتگی نفس های آرام و عمیق بکشنند.

برای مشکل خواب : خوردن غذاهای سبک و زودهضم ، شیر گرم چند ساعت قبل از خواب ، عدم مصرف قهوه و چای در ساعت پایانی روز ، چرت نزدن در طول روز و فعالیت بدنی مناسب

استروژن نقش مهمی در سلامت استخوان ها و قلب دارد و کاهش این هورمون در خون، فرد را بیشتر در معرض پوکی استخوان و مشکلات قلب و عروق قرار می دهد همچنین احتمال ابتلا به عفونت های ادراری و واژینال و مشکلات دندانی هم بیشتر است پس باید با مراجعته به پزشک و مشورت با او و با رعایت بهداشت فردی و رژیم غذایی مناسب و ورزش های منظم از این عوارض کاست

فعالیت ۴

با توجه به شکل ۸ درباره پرسش های زیر با هم گفت و گو کنید.

در انسان مام یاخته اولیه، ثانویه و تخمک از لحاظ فام تن ها چه تفاوت هایی با هم دارند؟

اولین جسم قطبی با دومین اجسام قطبی چه تفاوتی دارند؟

مراحل تخمک زایی در این شکل را با مرحله زامه زایی (شکل ۲) مقایسه کنید. شباهت ها و تفاوت های آنها را بنویسید.

الف) مام یاخته اولیه : از نظر عدد فام تنی (تعداد فام تن ها) ، یاخته دیپلوبئید یا ۲۷ (در انسان ۴۶) فام تنی است و از نظر شکل ، فام تن های این یاخته به شکل تترادی هستند

مام یاخته ثانویه : از نظر عدد فام تنی ، هاپلوبئید یا ۱۱ (در انسان ۲۳) فام تنی و از نظر شکل ، فام تن های این یاخته به شکل دو فامینکی هستند

تخمک : از نظر عدد فام تنی یاخته هاپلوبئید یا ۱۱ فام تنی (مثل مام یاخته ثانویه) و از نظر شکل ، فام تن های یاخته به شکل تک فامینکی هستند

ب) اولین جسم قطبی حاصل کاستمان یک است و از نظر فام تنی شبیه مام یاخته ثانویه اما دومین جسم قطبی حاصل کاستمان ۲ و از نظر فام تنی شبیه تخمک است

پ) شباهت مرافق زامه زایی و تخمک زایی : فرآیند درون اندام های جنسی و با تقسیم کاستمان رخ می دهنند . هر دو ابتدا رشتمان و بعد کاستمان رخ می دهد . در هر دو، کاستمان در دو مرحله انجام می شود . در هر دو یاخته های جنسی هاپلوبئید (۱۱ فام تنی) تولید می شوند که برای تولید مثل جنسی جاندار لازمند و یاخته های حاصل از نظر فام تنی مثل هم هستند.

زامه زایی : تقسیم مساوی سیتوپلاسم صورت می گیرد در نتیجه حاصل کاستمان ۱ و ۲ ، چهار زامه است. از زمان بلوغ آغاز می شود و تا پایان عمر ادامه می یابد . پس تا زمان بلوغ هیچ زامه هی در لوله های زامه ساز دیده نمی شود . تمام مرافق آن درون اندام های جنسی نر (لوله های زامه ساز بیضه) رخ می دهد . زامه های رها شده درون لوله های زامه ساز مرافق کاستمان را طی کرده و تقسیم یاخته ای کاستمان را کامل کرده اند و فقط در ابتدا قادر به حرکت نیستند.

تخمک زایی : تقسیم نامساوی سیتوپلاسم صورت می گیرد در نتیجه حاصل کاستمان ۱ و ۲ ، یک مام یاخته و سه جسم قطبی است. از دوران جنینی آغاز می شود و تخمک زایی همان زمان در پروفاز ۱ متوقف می شود . پس در زمان تولد تا بلوغ ، همه مام یاخته های اولیه در تخدمان ها وجود دارند . در سن بلوغ هر ماه معمولاً یک تخمک (مام یاخته ثانویه) از یکی از تخدمان ها ساز مراحل کاستمان را طی کرده و تقسیم یاخته ای کاستمان را کامل می یابد . بیشتر مرافق آن درون اندام های جنسی ماده (انبانک تخدمان) رخ می دهد (تا انتهای کاستمان ۱، چون کاستمان ۲ درون لوله رحمی و به شرط لقادره رخ می دهد) . مام یاخته رها شده به درون لوله های رحم هنوز تقسیم کاستمان خود را کامل نکرده اند و کاستمان ۲ را به شرط لقادره کامل می کنند (تبديل به مام یاخته ثانویه می شوند) . بیشترین تغییرات هورمونی مربوط به LH و در نیمه دوره جنسی یعنی روز ۱۴ است و مقدار FSH هم تا حدودی افزایش می یابد (علتش) مربوط به افزایش ترشح استروژن است .

فعالیت ۶

در بعضی از منابع، دوره جنسی تخدمان هارایه دو قسم تخلیکولی و جسم زردی (واتال) تقسیم چند می کنند

به نظر شما: ۱- هر قسم مربوط به چه بخشی از دوره جنسی است؟ ۲- در هر قسم، چه هورمون هایی

از هیچ قیزی شتر روی تخدمان اثر می گذارد؟ ۳- در هر قسم چه هورمون هایی از تخدمان ترشح می شود و چه تغییری در میزان

این هورمون ها رخ می دهد؟ ۴- جداگانه این دو بخش چه مرحله ای است؟

- ۱- قسمت یا مرحله انبانکی مربوط به نیمه اول از دوره جنسی است که در آن انبانک رشد می کند و درونش مام یاخته در حال رشد است و قسمت یا مرحله جسم زردی یا لوتنال مربوط به نیمه دوم از دوره جنسی است که با تشکیل جسم زرد آغاز می شود و با تشکیل جسم سفید تمام می شود.

- ۲- در مرحله انبانکی، هورمون FSH در ابتدای مرحله و هورمون LH در انتهای مرحله و در مرحله جسم زردی، هورمون LH در ابتدای مرحله و هورمون FSH در انتهای مرحله بیشتر روی تخدمان اثر می گذارد

- ۳- در مرحله انبانکی با رشد انبانک، هورمون استروژن، از مقدار کم به بیشترین مقدار خود می رسد و بعد در انتهای مرحله مقدارش کاهش می یابد

در مرحله جسم زردی، با رشد جسم زرد، ابتدا پروژسترون، به بیشترین مقدار خود می رسد و در انتهای مرحله به تدریج کاهش می یابد. البته استروژن هم مقداری بالا می رود و در انتهای کاهش می یابد.

- ۴- مرحله تخمک گذاری است که در آن انبانک به جسم زرد تبدیل می شود.

فعالیت ۷

۱- دوقلوهای ناهمسان از لحاظ جنسیت می توانند مشابه یا متفاوت باشند، به نظر شما علت چیست؟

۲- دوقلوهای به هم چسبیده از لحاظ جنسیت و سایر صفات ظاهری نسبت به هم چگونه اند؟

۳- در مورد اثر انگشت دوقلوهای همسان و ناهمسان اطلاعاتی راجع آوری و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید.

- ۱- چون دوقلوهای ناهمسان حاصل لفاح بین دو مام یاخته ثانویه با دو زامه مجزا هستند تخم های حاصل از هر کدام و در نتیجه جنین ها می توانند متفاوت یا مشابه باشند یعنی یکی دختر و یکی پسر یا هر دو دختر و یا هر دو پسر باشند.
اگر در هر دوی این لفاح ها زامه ها حاوی فام تن جنسی ۲ یا هر دو زامه دارای فام تن جنسی X باشند دوقلوها جنسیت مشابه خواهند داشت ولی اگر زامه در یک لفاح، دارای فام تن جنسی ۲ و زامه، در لفاح دیگر دارای فام تن جنسی X باشد جنسیت دوقلوها متفاوت خواهد بود).

- ۲- دوقلوهای به هم چسبیده چون حاصل یک تخم لفاح یافته هستند و در مراحل تقسیم بخوبی از هم جدا نشده اند بنابراین با توجه به یکسان بودن فام تن هایشان دارای جنسیت مشابه و صفات ظاهری مشابه هستند

- ۳- این اثر انگشت ها حتی در دوقلوهای همسان هم متفاوتند چون اثر انگشت تحت تاثیر عوامل اثر گذار بر رشد جنین در رحم می تواند تغییر کند (مثل قطر و طول بند ناف، استرس های واردہ به جنین ها و ...)

فعالیت ۸

مادران باردار ممکن است تا پایان هفتة چهارم بعد از لفاح هنوز از بارداری خود مطلع نباشد. با توجه به

زمان های چرخه قاعدگی به نظر شما این مادران از نظر قاعدگی در چه وضعیتی هستند؟

اگر تخمک گذاری در روز چهاردهم دوره اتفاق افتاده باشد و بلافضله در رحم لفاح رخ داده باشد، پایان هفتة چهارم بعد از لفاح، یعنی از اتمام دوره قبل، ۱۴ روز گذشته است و هنوز قاعدگی در فرد اتفاق نیافتداده است و از زمان معمول قاعدگی این شخص، ۱۴ روز گذشته است. یعنی ۱۴ روز تأخیر داشته است. البته این تأخیر برای اکثر مادران و پزشکان معنی دار است.

فعالیت ۹

تعیین زمان تولد

متخصصان زنان و زایمان در پیش بینی زمان تولد نوزاد ۲۸۴ روز

را به زمان شروع آخرین قاعدگی مادر اضافه می کنند. با توجه به نمودارهای شکل ۸ به پرسش های زیر پاسخ دهید.

۱- چه ارتباطی بین قاعدگی و بارداری شخص وجود دارد؟

۲- چرا روز شروع آخرین قاعدگی را در نظر می گیرند؟

۳- گفته می شود مدت زمان بارداری ۳۸ هفته یا ۲۶۶ روز است. چرا پزشکان ۲۸۴ روز را مطرح می کنند؟

- ۱- وقتی قاعدگی در موعد مقرر یا در حد انتظار رخ مدد نشانه بارداری است.

-۲- چون تخمک گذاری و لقاح ، علامت مشخص و خاصی ندارند ولی شروع قاعده‌ی برای شخص کاملاً مشخص است و معمولاً در نیمة دوره جنسی شخص ، تخمک گذاری انحصار می‌شود و لقاح بعد از تخمک گذاری رخ می‌دهد . بنابراین ، محاسبات آن دقیق‌تر انجام می‌شود .

-۳- ۱۴ روز ابتدای دوره که هنوز تخمک گذاری انجام نشده است را به آن اضافه می‌کنند، یعنی اگر دوران بارداری را همان ۹ ماه حساب کنیم و ۱۴ روز به آن اضافه کنیم ، می‌شود ۲۸۴ روز . البته مدت زمان بارداری پس از لقاح همان ۳۸ هفته یا ۲۶۶ روز است .

فعالیت ۱۰

علاوه بر زایمان طبیعی، تولد توزاد با عمل جراحی (سزارین)

نیز انجام می‌شود. پزشکان زنان و زایمان، بیشتر توصیه می‌کنند که زایمان به صورت طبیعی انجام شود. در مورد جنبه‌های مثبت و منفی جراحی سزارین، اطلاعاتی را جمع‌آوری کنید و تابع په دست آمده را به صورت گزارش در کلاس ارائه کنید.

- جنبه‌های منفی سزارین: - دوره ریکاوری و بهبود پس از عمل طولانی تر است - درد بعد از زایمان در سزارین بیشتر است - رفتمندی به سرویس بهداشتی برای او تا چندین روز مشکل است . - ماندن جای زخم و بخیه روی شکم و احساس خارش در آن است. - نیاز به خارج کردن رحم ، چسبندگی پس از سزارین ، عفونت مثانه یا رحم ، انسداد روده ، ناباروری یا سقط جنین در آینده و احتمال آسیب به جنین بیشتر است - سزارین ممکن است در بارداری‌های بعدی اشکال ایجاد کند مثل جفت سرراهمی ، جفت در عضله رحم

جنبه‌های مثبت سزارین : - برنامه ریزی برای زمان سزارین - نیازی به تحمل درد در زمان طولانی نیست - به نوزاد فشار زیادی وارد نیم شود یعنی احتمال آسیب آن کمتر است . - به دلیل بی هوشی مادر از اشک و عرق و ... خبری نیست و مادر خروج مایعات و خون را مشاهده نمی‌کند - نیازی به معاینات مکرر توسط پزشک و پزشکیار در حین زایمان نیست.

فصل ۸

فعالیت ۱

با مراجعه به یک مرکز پرورش گل، یا گل فروشی درباره روش تکثیر

رویشی گیاهان متفاوت، گزارش تصویری تهیه و در کلاس ارائه دهید.

جهت جمع‌بندی آموخته‌ها و نیز گسترش یادگیری و برقراری ارتباط با زندگی طراحی شده است . دانش آموزان این فرصت را دارند تا از نزدیک با مشاغل و تجارب صاحبان مشاغل و نیز انواعی از فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با موضوع مطالعه آشنا شوند.

فعالیت ۲

الف) تموثه‌هایی از ساقه‌های زیرزمینی را به کلاس بیاورید و در گروه خود مقایسه کنید

ب) شلغم و سیب زمینی را با هم مقایسه کنید. آیا شلغم همانند سیب زمینی ساقه است؟ چه استدلالی

برای پاسخ خود دارید؟

الف) می‌توانید پیاز گل‌ها ، زمین ساقه زنجبیل و سیب زمینی را به کلاس بیاورید . در صورت در اختیار نداشتن گیاه توت فرنگی از تصویر آن استفاده کنید . در این فعالیت مواردی مانند شکل ظاهری ، ذخیره‌ای یا ذخیره‌ای نبودن ساقه و محل ذخیره را مقایسه کنید.

فعالیت ۳

فرض کنید از شما خواسته‌اند که با استفاده از یاخته‌های مجزای نرم آکنده‌ای، گیاهی را به روش کشت بافت

تکثیر دهید. توضیح دهید این یاخته‌های از چه سامانه باقی جاذی می‌کنند و چگونه این کار را انجام می‌دهید؟

از سامانه بافت زمینه‌ای زیرا این سامانه تعداد فراوانی یاخته نرم آکنه‌ای دارد . همچنین می‌دانیم که بخار اتصال یاخته‌های گیاهی بکارگیری آنزیم‌ها برای جدا شدن یاخته‌های گیاهی ضروری است.

فعالیت ۴

چند نوع گل را با تعداد گلبرگ های چهار تاشش به کلاس بیاورید.

الف) تک لپه یا دولپه ای بودن آنها را مشخص کنید.

ب) تعداد هر یک از اجزای دیگر گل چیست؟ پ) گل ها را به دقت با ذره بین مشاهده و ویژگی های هر یک از اجزاء را یادداشت

کنید. ت) با استفاده از تیغ برش های طولی و عرضی از هادگی گل، تهیه و آنچه رامی بینید یادداشت و ترسیم کنید.

ث) با استفاده از داده هایی که به دست آورده اید، ساختار هر گل را گزارش کنید.

طبق دستور العمل انجام می شود. منظور از گزارش ساختار گل، توصیف گل از نظر تعداد، شکل، رنگ و ... و به عبارتی همه صفاتی است که گل دارد.

فعالیت ۵

الف) بعضی گرده افشاران، مانند خفاش در شب تقدیم می کنند. به نظر شما گل هایی که به وسیله این

جانوران گردیده افشارانی می شوند، چه ویژگی هایی دارند؟ با مراجعه به منابع معتبر درستی نظر خود را بررسی و

نتیجه را گزارش کنید.

ب) با توجه به ویژگی گل های دار گرده افشارانی می شوند، نوع گرده افشارانی را در گیاهان محیط پیرامون

خود پیش بینی و گزارش کنید.

الف) رنگ برای گرده افشار هایی که در شب فعال اند معنی دار نیست. این گل ها سفید رنگ و دارای بوهای قوی هستند.

ب) با توجه به رنگی بودن یا نبودن گلبرگ ها، وجود شهد یا بو درباره نوع گرده افشارانی گیاهان پیرامون خود قضاوت کنید.

فعالیت ۶


الف) دانه هایی مانند لوبيا و ذرت را در شرایط مناسب قرار دهيد تا رویش یابند. این کار را چگونه انجام

می دهید؟ با مشاهده دانه های در حال رویش، مشخص کنید ابتدا کدام یک از اندام های رویشی از دانه خارج

می شوند. این مشاهده را برای انواعی از دانه های دیگر تیز انجام دهید. نتیجه را به صورت یک گزاره پرسیسید.

ب) دانه های لوبيا و ذرت را در قواصل زمانی دو روزه، بعد از خیس خوردن از وسط نصف و با استفاده از شکل زیر آنچه را


می دانید، نام گذاری کنید.



از قبل می دانید که برای رویاندن دانه ها باید ابتدا آن ها را یک یا دو روز بخیسانید و مرطوب نگه دارید تا رشد کنند. با مشاهده رویش انواع دانه ها پی می بریم که ابتدا ریشه خارج می شود و در نتایج مشاهدات مهم است به این نکته بررسیم که: "هنگام رویش دانه، ریشه اولین اندامی است که خارج می شود"

فعالیت ۷



برچه ها را در میوه های زیر می توانیم تشخیص دهیم. در شکل زیر تعدادی میوه از عرض برش خورده اند. تعدادی میوه را انتخاب و به طور عرضی برش دهید. در کدام میوه قضاوی تخمدان با دیواره برچه ها به طور کامل تقسیم شده است؟



این فعالیت برای مشاهده برچه درون میوه ها است. هر یک از پره های پرتقال یک برچه را نشان می دهد. همچنین از فلفل دلمه ای و خیار می توانیم برای مشاهده برچه ها استفاده کنیم. ضمن این که با ایجاد برش عرضی در میوه ها مفهوم برچه بهتر درک می شود. ممکن است در فلفل دلمه ای برچه ها کاملا از هم جدا نشده باشند.

فعالیت ۸

شکل زیر انواعی میوه را نشان می دهد. ویژگی های هر یک از این میوه ها را فهرست و براساس این ویژگی ها پیش یعنی کنید که پراکنش آنها با کمک چه عاملی (باد / جانور) انتظام می شود. با مراجعه به منابع معتبر درستی نظر گروه را بررسی و نتیجه را گزارش کنید.




میوه هایی که دارای کرک یا بال هستند (میوه های ۱ و ۴) با باد و میوه هایی که دارای زوائد خارمانند هستند (میوه ۲ و ۳) با چسبیدن به پشم موی جانوران یا لباس انسان در محیط جابجا می شوند،

فعالیت ۹

الف) اکثر گرده افشاران ها، حشره اند و گرده افشارانی بسیاری از گیاهان کشاورزی و درختان میوه به کمک آنها انتظام می شود. درباره عواملی که زندگی حشره های گرده افشاران را تهدید می کند، تحقیق و نتیجه را گزارش کنید.

ب) شکل زیر چرخه زندگی یک گیاه تهان دانه را نشان می دهد. جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید.



الف) به کارگیری حشره کش ها و سموم دفع آفات مشکل ساز است زیرا اثرات سوء دارد و باعث نابودی حشراتی می شود که آفت گیاهان کشاورزی و محصولات باگی به شمار نمی روند و در عوض برای آن ها مفیدند. از تهدید های دیگر می توان به امواج رادیویی که مثلا شامل امواج تلفن های همراه می شود اشاره کرد.

فعالیت ۱

شکل رو به تمایز ریشه و ساقه را از یک توده باخته تمایز نیافته یا همان کال در حضور مقدار متفاوت اکسین و سیتوکینین، در محیط کشت نشان می‌دهد.
از این شکل چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟



سیتوکینین در ریشه زایی (به معنی ایجاد ریشه‌های فرعی)، نقش بازدارنده یا نقش منفی دارد.

فعالیت ۲

یکی از دلایل خراب شدن میوه‌ها هنگام ذخیره یا انتقال، تولید اتیلن در آنهاست. برای رفع این مشکل، ترکیباتی به کار می‌برند که با اتصال به گیرنده‌های اتیلن که در باخته وجود دارد، سبب توقف فرآیند رسیدگی می‌شوند. اکنون زیست شناسان در تلاش اند با تغییر در رُن، گیاهان را نسبت به اتیلن غیر حساس کنند. به نظر شما این ایده برای گیاهان میوه‌دار مناسب است؟ برای پاسخ خود دلیل ارائه دهید.

چنین ایده‌ای برای درختان میوه و به طور کلی گیاهانی که از میوه آن‌ها استفاده می‌شود مناسب نیست. در صورتی که با تغییر زن بتوان باخته‌های گیاه را نسبت به اتیلن غیر حساس کرد به این معنی است که در فرآیند رسیدگی میوه اختلال ایجاد کرده ایم.

فعالیت ۳

با توجه به اینکه فرمول شیمیایی تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی شناخته شده است، این ترکیبات به طور مخصوصی ساخته می‌شوند و برای تولید و تهیه محصولات کشاورزی به کار می‌روند. به نظر شما آیا این ترکیبات می‌توانند سلامت انسان و محیط زیست را تهدید کنند؟

به علت شباهت‌های ساختاری که ممکن است با بعضی ترکیبات بدن انسان و جانداران دیگر داشته باشند در فرآیند‌های زیستی وارد می‌شوند و می‌توانند اثرات نامطلوبی بر محیط زیست و انسان بگذارند. مثلاً سیتوکینین‌ها باعث تحریک تقسیم باخته می‌شوند. حال اگر سیتوکینینی که به طور مصنوعی ساخته شده وارد بدن جانداران شود ممکن است سرعت تکثیر برخی باخته‌ها را افزایش داده و منجر به سرطان شوند. توجه کنید که این ترکیبات در گیاهان در حجم عظیم وجود ندارند در حالی که ترکیبات مصنوعی معمولاً همراه مواد دیگر که نقش حجم دهنده یا پایدار کننده دارند و در مقداری فراوان و گاه بدون رعایت استانداردهای لازم به کار می‌روند.


فعالیت ۴

الف) پیش‌بینی می‌کنید که پاسخ ریشه به نور یک جانبه چه باشد؟

ب) برای بررسی درستی پیش‌بینی خود، آزمایشی طراحی کنید.

پ) آزمایشی را که طراحی کرده‌اید با چند گیاه انجام و نتیجه را گزارش دهید.

در طراحی آزمایش باید متغیرهای مستقل و وابسته را مشخص کرد. متغیر مستقل در اینجا، نور و متغیر وابسته، پاسخ ریشه است. بنابر این پاسخ ریشه به متغیر مستقل در دو حالت وجود نور و نبود نور بررسی می‌شود. در این آزمایش برای کنترل بهتر شرایط باید پاسخ ریشه اولیه به نور یک جانبه بررسی شود. نتایج این آزمایش به صورت کیفی و در سه حالت ممکن ارائه می‌شود. گرایش مثبت به سمت نور، گرایش منفی به سمت نور، بی تفاوت (در اینجا منظور اینست که ریشه خم نشود)

**فعالیت ۵**

با توجه به شکل مقابل و شکل ۱۲-ب توضیح دهید که شکستن شب با یک جرقه نوری چه تاثیری بر گل دهی گیاه روزگو تا دارد.

تصاویر نشان می‌دهد که شکستن شب با یک جرقه نوری سبب می‌شود که گیاه روزگو تا داوودی، گل ندهد.

فعالیت ۶

بعضی گیاهان با تولید موادی که برای گیاهان دیگر سقی اند، از رویش دانه یا رشد گیاهان دیگر در اطراف خود جلوگیری می کنند. به نظر شما این ویژگی چه نقشی در ماندگاری چنین گیاهانی دارد؟

رقابت بین همه جانداران بر سر دست یابی به منابعی مانند مواد مغذی و جا، نور و ... وجود دارد. گیاهی که بتواند مانع از رشد گیاهان دیگر در اطراف خود شود به منابع بیشتری دست می یابد و احتمالاً در رقابت با گیاهان دیگر در ماندگاری موفق تر عمل می کند. این پدیده آللوباتی (Allelopathy) نامیده می شود.

فعالیت ۷

الف) فردی بر این باور است که امواج صوتی بر رشد و میزان محصول گیاهان تأثیر دارد. آیا شما با این نظر موافق اید؟ برای تأیید یا رد این نظر چه آزمایشی طراحی می کنید؟

ب) تموتهای از سازوکارهای دفاعی در گیاهان محل زندگی خود و نیز ارتباطهایی که بین آنها و جانوران وجود دارد گزارش کنید.

الف) در طراحی، آزمایش باید دارای فرضیه، مشخص کردن متغیرها و نیز روش کار باشد. مثبت یا منفی بودن پاسخ ما تأثیر چندانی در طرح آزمایش ندارد زیرا این طرح باید شامل یک گروه تیمار و حداقل یک گروه آزمودنی باشد. گروه تیمار باید در محیطی بدون صدا و گروه آزمودنی باید در یک محیطی قرار بگیرد که صدایی با ویژگی های مشخص و کنترل شده در آن وجود دارد. سایر عوامل نیز باید برای گروه تیمار و آزمودنی یکسان باشد. می توان اثر صوت را مثلاً بر رویش دانه بررسی کرد.

ب) این فعالیت باید قبل از تدریس فصل انجام شود تا با استفاده از ارائه دانش آموزان به آن بپردازیم. دانش آموزان با استفاده از فصل اینمنی در جانوران و تجربه های خود می توانند ارائه ای ساده از این مفهوم در گیاهان داشته باشند.

تیله و تنظیم: هانیه مرادی-دبیر ناحیه ۳ کرمانشاه